



17-05-2016

Francisco Javier Cervigon Ruckauer

Ha participado en el siguiente curso de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea:



El niño que ronca

La frecuencia del ronquido durante el sueño es del 5-10%, en población infantil general. El ronquido es patológico en ausencia de procesos infecciosos de vía aérea superior. Su consecuencia es una menor oferta de oxígeno a diversos órganos, dando lugar a trastornos en el crecimiento y maduración en la infancia con repercusión también en el adulto

Duración del curso: 6 semanas (30 horas de estudio estimadas)

17-05-2016

Francisco Javier Cervigon Ruckauer

Ha participado en el siguiente curso de la

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea:

El niño que ronca

La frecuencia del ronquido durante el sueño es del 5-10%, en población infantil general. El ronquido es patológico en ausencia de procesos infecciosos de vía aérea superior. Su consecuencia es una menor oferta de oxígeno a diversos órganos, dando lugar a trastornos en el crecimiento y maduración en la infancia con repercusión también en el adulto.

Duración del curso: 6 semanas (30 horas de estudio estimadas)

Identificador: c2be7d0c-79b0-4db2-b043-c15e9e0423b2