


(II) الدالة مقلوب



نشاط : المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O ; i ; j)$ في الشكل المقابل $(M(x ; y)$ نقطة من المستوي لا تنتمي إلى محوري المعلم حيث مساحة المستطيل الملون هي I وحدة المساحات

(1) ما هي مجموعة قيم x الممكنة ؟ وما هي مجموعة قيم y الممكنة ؟
(2) أكتب y بدلالة x .

(3) نعرف الدالة f بالشكل : $y = f(x)$ حيث x و y لهما نفس الإشارة .
ما هي مجموعة تعريف الدالة f ؟

(4) أملئ الجدول الآتي :

x	-4	-3	-2	-1	0.5	1	2	4
$f(x)$								

(5) مثل في المعلم $(O ; i ; j)$ النقطة $(M(x ; f(x))$ حيث x تأخذ القيم المعروضة في الجدول .

(6) أدرس اتجاه تغير الدالة f .

(7) أدرس شفعية الدالة f .

(8) أنشئ المنحني الممثل للدالة f في المعلم السابق .

حل النشاط :

(1) ما هي مجموعة قيم x الممكنة ؟ وما هي مجموعة قيم y الممكنة ؟

بما أن $(M(x ; y)$ لا تنتمي إلى محور الترتيب فإن $x \neq 0$ ومعناه أن قيم x الممكنة هي كل قيم $i \in \mathbb{R}^*$ أي $x \in \mathbb{R}^*$
بما أن $(M(x ; y)$ لا تنتمي إلى محور الفواصل فإن $y \neq 0$ ومعناه أن قيم y الممكنة هي كل قيم $j \in \mathbb{R}^*$ أي $y \in \mathbb{R}^*$

(2) كتابة y بدلالة x . لدينا مساحة المستطيل الملون هي $|x| \cdot |y| = 1$ معناه $|y| = \frac{1}{|x|}$

ومعناه أنه : إذا كان $y \in \mathbb{R}^+$ فإن : $y = \frac{1}{|x|}$ وإذا كان $y \in \mathbb{R}^-$ فإن : $y = -\frac{1}{|x|}$

(3) نعرف الدالة f بالشكل : $y = f(x)$ حيث x و y لهما نفس الإشارة .
ما هي مجموعة تعريف الدالة f ؟ ثم أكتب عبارة $f(x)$.

مجموعة تعريف الدالة f هي $D_f = \mathbb{R}^* =]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$

لدينا: إذا كان $y \in \mathbb{R}^+$ فإن : $y = \frac{1}{|x|}$ بما أن x و y لهما نفس الإشارة فإن $x \in \mathbb{R}^+$ ومنه : $f(x) = \frac{1}{x}$


لدينا: إذا كان $y \in \mathbb{R}^-$ فإن : $y = -\frac{1}{|x|}$ بما أن x و y لهما نفس الإشارة فإن $x \in \mathbb{R}^-$ ومنه : $f(x) = -\frac{1}{x}$

إذن من أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$: $f(x) = \frac{1}{x}$

(4) أملأ الجدول :

x	-4	-3	-2	-1	0.5	1	2	4
$f(x)$	-0.25	-0.33	-0.5	-1	2	1	0.5	0.25

(5) مثل في المعلم $(O ; i ; j)$ النقطة $(M(x ; f(x))$ حيث x تأخذ القيم المعروضة في الجدول .



(6) أدرس اتجاه تغير الدالة f .

لدينا x و $f(x)$ لهما نفس الإشارة

لدينا : إذا كان a و b عددان من المجال $]0 ; +\infty[$

فإن : $a > b$ معناه $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ أي : $f(a) < f(b)$

و إذا كان a و b عددان من المجال $]0 ; +\infty[$ فإن : $a > b$ معناه $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ أي : $f(a) < f(b)$
 إذن الدالة f متناقصة تماما على كل من المجالين $]0 ; +\infty[$ و $]0 ; -\infty[$.

x .	$-\infty$ ∞	0	$+$
$f(x)$			

(7) أدرس شفعية الدالة f .

لدينا كل عناصر المجموعة $\mathbb{R}^*$ متناظرة بالنسبة إلى العدد 0

أي من أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$ فإن $x \in \mathbb{R}^*$

ولدينا : من أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$: $\frac{1}{-x} = -\frac{1}{x}$

أي $f(-x) = -f(x)$ ومنه الدالة f فردية.

(8) إنشاء المنحني الممثل للدالة f في المعلم السابق .

التعريف : الدالة مقلوب هي الدالة التي ترفق بكل عدد حقيقي غير معدوم مقلوبه

$$f(x) = \frac{1}{x} \text{ أو } f : x \mapsto \frac{1}{x} \text{ ونكتب :}$$

ملاحظات :

- الدالة مقلوب معرفة على المجموعة $\mathbb{R}^*$: $]0 ; +\infty[$ و $]0 ; -\infty[$
- كل عدد حقيقي x غير معدوم له نفس إشارة صورته بالدالة مقلوب.

مبرهنة : الدالة مقلوب هي دالة متناقصة تماما وموجبة على المجال $]0 ; +\infty[$ ومتناقصة تماما وسالبة على المجال $]0 ; -\infty[$

خاصية : الدالة مقلوب المعرفة على كل مجموعة عناصرها متناظرة بالنسبة إلى 0 هي دالة فردية ومنحنيتها الممثل في معلم يكون متناظرا بالنسبة إلى مبدأ هذا المعلم.

تعريف : منحنى الدالة مقلوب الممثل في معلم يسمى قطعاً زائداً.


تمرين 28 صفحة 108

$$f(x) = \frac{2}{x} \quad \text{ب : }]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$$

- (1) أدرس تغيرات الدالة f وشكل جدول تغيراتها
- (2) مثل بيانياً الدالة f على المجموعة $]0 ; 3[\cup]3 ; +\infty[$ في معلم متعامد ومتجانس.

الحل :

- (1) أدرس تغيرات الدالة f وشكل جدول تغيراتها



لدينا الدالة مقلوب $f(x) = \frac{2}{x}$ متناقصة تماماً على كل من المجالين

$]0 ; +\infty[$ و $]-\infty ; 0[$ إذن :

من أجل كل عددين a و b من المجالين $]0 ; +\infty[$ و $]-\infty ; 0[$

لدينا $a > b$ معناه $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ وهذا يعني أن : $\frac{2}{a} < \frac{2}{b}$

أي : $f(a) < f(b)$

إذن الدالة f متناقصة تماماً على كل من المجالين

$]0 ; +\infty[$ و $]-\infty ; 0[$ ومنه جدول التغيرات الدالة f :

- (2) مثل بيانياً الدالة f على المجموعة

$]0 ; 3[\cup]3 ; +\infty[$ في معلم متعامد ومتجانس.

تمرين 31 صفحة 108

$$f(x) = \frac{3}{x+2} \quad \text{ب : }]-\infty ; -2[\cup]-2 ; +\infty[$$

- (1) أدرس تغيرات الدالة f وشكل جدول تغيراتها

- (2) مثل بيانياً للدالة f في معلم متعامد .

الحل :

- (1) دراسة تغيرات الدالة f وشكل جدول تغيراتها .

لدينا الدالة التآلفية $f(x) = \frac{3}{x+2}$ متزايدة تماماً على المجال i إذن هي متزايدة تماماً على كل من المجالين

$]-2 ; +\infty[$ و $]-\infty ; -2[$

ولدينا $f(x) = \frac{3}{x+2}$ موجبة على $] -2 ; +\infty[$ وسالبة على $]-\infty ; -2[$

إذن من أجل كل عددين a و b من المجال $]-2 ; +\infty[$ و $]-\infty ; -2[$:


$a > b$ معناه $a+2 > b+2$ معناه $\frac{1}{a+2} < \frac{1}{b+2}$ ومعناه $\frac{3}{a+2} > \frac{3}{b+2}$ أي : $f(a) < f(b)$

ومنه الدالة f متناقصة تماماً على المجال $]-2 ; +\infty[$ و $]-\infty ; -2[$

وبالمثل من أجل كل عددين a و b من المجال $]-2; +\infty[$

$a > b$ معناه $a + 2 > b + 2$ معناه $\frac{1}{b+2} > \frac{1}{a+2}$ ومعناه $\frac{3}{b+2} > \frac{3}{a+2}$ أي : $f(a) < f(b)$

ومنه الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-2; +\infty[$
جدول تغيرات الدالة f :



(2) التمثيل بيانيا للدالة f في معلم متعامد .

تمرين 32 صفحة 109

نعتبر f الدالة المعرفة على المجموعة $]-1; +\infty[\cup]-\infty; -1[$ بالعلاقة : $f(x) = \frac{2x+1}{x+1}$

- (1) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x حيث $x \neq -1$ لدينا : $f(x) = 2 - \frac{1}{x+1}$
(2) أدرس تغيرات الدالة f وشكل جدول تغيراتها.

الحل :

(1) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x حيث $x \neq -1$ لدينا : $f(x) = 2 - \frac{1}{x+1}$

الطريقة 1 : ليكن $x \neq -1$: $f(x) = \frac{2x+1}{x+1} = \frac{2(x+1)}{x+1} - \frac{1}{x+1} = 2 - \frac{1}{x+1}$


الطريقة 2 : ليكن $x \neq -1$: $2 - \frac{1}{x+1} = \frac{2(x+1)}{x+1} - \frac{1}{x+1} = \frac{2x+1}{x+1} = f(x)$

(2) دراسة تغيرات الدالة f وتشكل جدول تغيراتها.

ليكن a و b عددين حقيقيين من المجموعة $]-1; +\infty[\cup]-\infty; -1[$ معناه $a > b$ معناه $a + 1 > b + 1$

معناه $\frac{1}{b+1} > \frac{1}{a+1}$ معناه $-\frac{1}{b+1} < -\frac{1}{a+1}$ معناه $2 - \frac{1}{b+1} < 2 - \frac{1}{a+1}$

معناه $f(b) < f(a)$ إذن الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $]-1; +\infty[$ و $]-\infty; -1[$
جدول تغيرات الدالة f :



دراسة $f(x)$ عندما يكون x كبير جدا أو صغير جدا :

لدينا $f(10^5) \gg 2$ و $f(-10^5) \ll 2$

دراسة $f(x)$ عندما يكون x قريب جدا من -1 :

$$f(-1,0001); 10002 \text{ و } f(-0,9999); -9998$$

ومنه: عندما يؤول x إلى $(-\infty)$ أو $(+\infty)$ فإن $f(x)$ يؤول إلى 2
وعندما يؤول x إلى 1 بقيم كبرى فإن $f(x)$ يؤول إلى $(-\infty)$ وبقيم صغرى $f(x)$ يؤول إلى $(+\infty)$
تمرين 33 صفحة 109

(C) هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة على المجموعة $[-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{3x+4}{x+1}$
و (H) هو القطع الزائد الذي يمثل الدالة مقلوب .

(1) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x حيث $x \neq -1$ لدينا: $f(x) = 3 + \frac{1}{x+1}$
(2) بين أنه يمكن استنتاج (C) انطلاقاً من (H) بانسحاب يطلب تعيين شعاعه.
الحل:

(1) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x حيث $x \neq -1$ لدينا: $f(x) = 3 + \frac{1}{x+1}$
ليكن x عدد حقيقي حيث $x \neq -1$:

$$f(x) = \frac{3x+4}{x+1} = \frac{3(x+1)+1}{x+1} = \frac{3(x+1)}{x+1} + \frac{1}{x+1} = 3 + \frac{1}{x+1} \quad \text{الطريقة 1:}$$

$$3 + \frac{1}{x+1} = \frac{3(x+1)}{x+1} + \frac{1}{x+1} = \frac{3(x+1)+1}{x+1} = \frac{3x+4}{x+1} = f(x) \quad \text{الطريقة 2:}$$

(2) بين أنه يمكن استنتاج (C) انطلاقاً من (H) بانسحاب يطلب تعيين شعاعه.

ليكن x عدد حقيقي غير معدوم ولتكن $M(x; \frac{1}{x})$ نقطة من المنحني
ليكن x' عدد حقيقي يختلف عن -1 ولتكن $M'(x'; 3 + \frac{1}{x'+1})$ نقطة من المنحني (C)

$$\frac{1}{x'+1} = \frac{1}{x} \quad \text{نضع: } x' = x - 1 \text{ وتصبح}$$

$$\frac{1}{x'+1} = \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{1}{x'+1} = \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{1}{x'+1} = \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{1}{x'+1} = \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{1}{x'+1} = \frac{1}{x}$$

$$u = x' + 1 \quad \text{إذن: } MM' = u$$

وبالتالي M' هي صورة M بالانسحاب الذي شعاعه u .

