

Type d'hygiène de mains	Lavage simple	Lavage antiseptique	Lavage chirurgical	Friction hygiénique
Objectifs (buts)	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminer les souillures. • Permet la diminution de la flore transitoire. • Prévient la contamination. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminer la flore transitoire. • Diminuer la flore résidente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminer la flore transitoire. • Diminuer de façon significative la flore résidente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminer la flore transitoire. • Diminuer la flore résidente.
Type du produit	savon liquide	savon liquide antiseptique.	savon antiseptique polyvidone	<ul style="list-style-type: none"> • Solution hydro-alcoolique.
Durée	30 secondes	1 minute	5 minutes.	jusqu'à évaporation complète du produit
indications	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de service/ fin de service. • Gestes de la vie courante : se coiffer, se moucher... • Activités hôtelières. • Lors des soins d'hygiène, de confort et de continuité de la vie. • Avant et après le port des gants à usage unique. • Lors de soins infirmiers non invasifs. • Après tout soin infirmier. • Mains visiblement sales et ou souillées par des contaminations non microbiennes. • Soins de contact avec la peau saine. 	<ul style="list-style-type: none"> • Après tout contact avec un patient en isolement septique et/ou infecté ou avec son environnement. • Après tout contact accidentel avec du sang ou des liquides biologiques. • Avant réalisation d'un geste invasif (cathéter périphérique, sonde ou urinaire et autres dispositifs analogues). • Avant tout acte stérile. • Entre deux patients, après tout geste potentiellement contaminant. • Avant tout contact avec un patient en isolement protecteur. • Avant réalisation d'une ponction lombaire, d'ascite, articulaire ou autres situations analogues. • Avant manipulation des dispositifs intra-vasculaires (cathéters), drains pleuraux, chambre implantable, et autres situations analogues. • En cas de succession de gestes contaminants pour le même patient. <p>Avant préparation et reconstitution alimentaire en restauration collective ou en office individuel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avant tout acte chirurgical, d'obstétrique et de radiologie interventionnelle. • Avant tout geste pour lequel une asepsie de type chirurgical est chirurgicale requise : pose de cathéter central, rachidien, chambre implantable, ponction amniotique, drain pleural et autres situations analogues 	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de service/ fin de service. • Gestes de la vie courante : se coiffer, se moucher... • Activités hôtelières. • Lors des soins d'hygiène, de confort et de continuité de la vie. • Avant et après le port des gants à usage unique. • Lors de soins infirmiers non invasifs. • Après tout soin infirmier. • Soins de contact avec la peau saine.

Lavage des mains