

Contrôle 2
BCGSem3

Exercice 1 : Les normes de sécurité aériennes interdisent le décollage des Airbus a380 dont le poids de cargaisons (passagers et leurs bagages) dépassent 195.925 tonnes. Admettons que le poids des passagers choisissant de voyager dans ce type d'appareil est une variable aléatoire distribuée selon une loi normale $N(75T, 38T^2)$ et le poids de leurs bagages est distribuée selon une loi normale $N(100T, 43T^2)$. En admettant que les poids des passagers et ceux des bagages sont indépendants et que la somme de deux variables indépendantes quelconques distribuées normalement suit la loi normale, calculer les chances pour qu'un avion a380 choisie au hasard soit interdit de décoller.

Exercice 2: On suppose que le poids (en milliers de Kg) d'un camion remorque empruntant une autoroute obéit à la loi $N(\mu, 2)$. On a pesé 20 camions remorques choisis au hasard et observé $\bar{X} = 7,4$ comme moyenne.

- Donnez un intervalle de confiance de niveau 90% pour μ .
- Quelle taille d'échantillon devriez-vous avoir afin que la longueur d'un intervalle de confiance de niveau 90% pour μ soit inférieure à 0,1?

Exercice 3: Une compagnie qui fabrique des piles s'intéresse à la durée de vie moyenne (en heures), μ de celles-ci. Un technicien mesure donc la durée de vie pour chacune des piles d'un échantillon de taille 150. La moyenne et la variance observées sont 4,7 et 0,07 respectivement. Donnez un intervalle de confiance de niveau 95% pour μ .

Exercice 4: Les lectures de tension artérielle systolique (en mm Hg) sur un individu à la même heure pendant 7 jours consécutifs sont :

161	155	142	157	150	158	156
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Supposons que la tension artérielle suit une loi normale, déterminez un intervalle de confiance, au niveau 95%, de la moyenne μ de la tension artérielle de cet individu.

Exercice 5: Vous avez prélevé un échantillon sur un caractère X obéissant à la loi $N(\mu, 4)$. Avec 5 observations, vous avez construit un intervalle de confiance de niveau 95% pour μ . L'intervalle obtenu est $[7.7869, 11.2931]$. Par la suite, vous vous rendez compte que vous avez oublié 3 observations qui valent 10.6, 10.7 et 10.9. Reconstituez votre intervalle de confiance de niveau 95% pour μ en tenant compte de ces nouvelles observations.

Exercice 6: En 1976, la commission Carnegie effectua une étude portant sur les $N=2700$ institutions de l'enseignement supérieur des USA à l'aide d'un échantillon aléatoire de taille $n = 225$. On a observé une moyenne de $\bar{x} = 3700$ étudiants inscrits par institution, avec un écart-type $s = 6000$. Trouvez un intervalle de confiance de niveau 95% pour μ , la moyenne d'inscrits par institution.

Exercice 7: On désire estimer la proportion p de pièces défectueuses parmi celles produites dans une usine au cours d'une journée. On sait que 100 000 pièces sont produites chaque jour. Pour se faire, on prélève un échantillon de n pièces sur une journée donnée.

- a) Si $n=300$ et que 21 pièces sont défectueuses dans cet échantillon, donnez un intervalle de confiance de niveau 95% de p .
- b) On veut construire un intervalle de confiance de niveau 95% pour p . Quelle est la taille minimale d'échantillon nécessaire afin que la longueur de l'intervalle soit d'au plus 0,01?

Exercice 8: Une firme de sondage désire estimer la proportion de personnes en faveur d'un parti politique. Elle s'est fixée une marge d'erreur d'au plus 3% et ce 19 fois sur 20. Combien de répondants lui faut-il? Considérer le cas N grand et $N = 5000$.