



(510) 679-3300
27206 Calaroga Ave - Ste 201
Hayward, CA 94545
BALMEDS.com

Reconstituting Sermorelin Instructions

To prevent possible contamination, wipe the rubber vial stoppers of both the bacteriostatic water and the sermorelin vial with an antiseptic solution before puncturing them with the needle.

To reconstitute Sermorelin, use the 22g needle to draw 6mL of bacteriostatic water.

First, inject the 6mL of bacteriostatic water into the vial of Sermorelin aiming the liquid against the glass vial wall.

If your vial is not able to fit the 6mL completely you will need to draw out 3mL of bacteriostatic water and add it to the empty brown vial given. Then draw another 3 mL of bacteriostatic water and inject into the vial of the sermorelin aiming against the glass vial wall. Draw out the 3 mL out of the Sermorelin vial and add it to the brown vial to create a 6mL vial and injection site with an alcohol wipe or other antiseptic solution. Remember to refrigerate once you are done!!!

It is recommended that Sermorelin be administered using sterile, disposable syringes and needles. Also to only reconstitute one month (one vial) at a time. The syringes should be of small enough volume that the prescribed dose can be drawn from the vial with reasonable accuracy.

Instrucciones para Reconstituir Sermorelin

Para evitar una posible contaminación, limpie los tapones de goma del vial tanto del agua bacteriostática como del vial de sermorelina con una solución antiséptica antes de pincharlos con la aguja.

Para reconstituir Sermorelin, utilice la aguja de 22 g para extraer 6 mL de agua bacteriostática. Inyecte estos 6 mL de agua bacteriostática en el vial de Sermorelin apuntando el líquido contra la pared del vial de vidrio. Agite el vial con un movimiento giratorio SUAVE hasta que el contenido se disuelva por completo. No administre Sermorelin si las partículas son visibles en la solución reconstituida o si la solución reconstituida está turbia. Conservar en la refrigeradora.

Antes de cada punción para su uso, limpie la parte superior del vial de sermorelina y el lugar de la inyección con una toallita con alcohol u otra solución antiséptica.

Se recomienda que Sermorelin se administre utilizando jeringas y agujas estériles y desechables. Las jeringas deben tener un volumen lo suficientemente pequeño para que la dosis prescrita pueda extraerse del vial con una precisión razonable.