Un wiphalus os ha hecho llegar el siguiente documento sobre los síntomas y la existencia o no de vacuna frente a las enfermedades que padecen los Rastianos

Rastiano	Síntomas	Vacuna
Graphor	El periodo de incubación oscila entre 2 y 21 días. Las personas no son contagiosas hasta que aparecen los síntomas. Se caracterizan por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa y dolores musculares, de cabeza y de garganta, lo cual va seguido de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y hemorragias internas y externas.	Actualmente no existe vacuna. Está en fase experimental. Los resultados obtenidos en la investigaciones son esperanzadores
Quimera	Muchas personas infectadas no presentan síntomas, especialmente en los primeros años y en general durante largo tiempo. El microorganismo va debilitando el sistema inmunológico lentamente y sería tras una media de 8-10 años sin tratamiento cuando aparecerían los siguientes síntomas: Pérdida brusca de peso superior al 10% Fiebre o sudoración nocturna durante más de un mes, diarrea crónica durante más de un mes, Fatiga persistente y aguda Otros síntomas secundarios: tos seca durante más de un mes, urticarias, úlceras bucales, hongos en boca y garganta, herpes e inflamación de los ganglios.	No existe vacuna contra esta enfermedad. Se destina una ingente cantidad de recursos económicos y personales a su investigación
Runespoor	Ees una enfermedad febril aguda. Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 15 días tras contacto con el vector. Puede resultar difícil reconocer el origen de los primeros síntomas (fiebre, dolor de cabeza y escalofríos), que pueden ser leves. Si no se trata en las primeras 24 horas puede agravarse, llevando a menudo a la muerte. Los síntomas incluyen: Anemia, Heces con sangre, Escalofríos, fiebre y sudoración, Coma Convulsiones, Dolor de cabeza, Ictericia, Dolor muscular, Náuseas y vómitos	Existen en la actualidad más de 70 vacunas candidatas en diferentes fases de investigación, pero ninguna que se haya mostrado lo suficientemente efectiva.

Rastiano	Síntomas	Vacuna
Lethifold	El periodo de incubación es de 24-48 horas. Los síntomas se inician con ataque súbito de diarrea acuosa, seguido por vómito y la fiebre generalmente está ausente.La diarrea tiene olor a pescado en el inicio, pero se convierte en menos olorosa y más líquida con el tiempo. La clásica diarrea en " agua de arroz", contiene mucho líquido y poca materia fecal y aparece dentro de las 24 horas del inicio de la enfermedad. En casos severos, el volumen de heces excede los 250 ml/Kg. dando lugar a deshidratación severa, choque y muerte si no es tratada.	Existe vacuna contra esta enfermedad y se administra de forma oral a personas que viajen a zonas donde está presente esta enfermedad. Su eficacia no es muy alta ni tampoco es duradera, aunque también parece proteger parcialmente frente a otros tipos de diarrea del viajero.
Bark	Los síntomas aparecen habitualmente 2-10 días tras la infección . En cerca del 10-20% de los casos, los síntomas son tan graves que a los pacientes se les debe colocar un aparato de respiración asistida. Los síntomas son fiebre alta (>38° C) , y uno o más síntomas respiratorios, incluyendo tos, respiración entrecortada, dificultad para respirar, signos de hipoxia o un diagnóstico de neumonía.	Actualmente existen varias vacunas pero no de efectividad demostrada. En proceso
Scarlet	Por lo general se manifiestan entre 12 y 36 horas después de la infección. La enfermedad puede ser mortal en el 5 a 10% de los casos. Se caracteriza por una parálisis progresiva descendente que puede producir insuficiencia respiratoria. Los síntomas iniciales incluyen fatiga intensa, debilidad y vértigo, seguidos generalmente por visión borrosa, sequedad de boca y dificultad para tragar y hablar. También pueden concurrir vómitos, diarrea e inflamación abdominal. La enfermedad puede dar lugar a debilidad en el cuello y los brazos, y afectar posteriormente los músculos respiratorios y los músculos de la parte inferior del cuerpo. No se presenta fiebre o pérdida de consciencia.	Existe una vacuna para su utilización en personal de laboratorio que trabaja con el germen. No hay disponible vacuna para la población general.

Rastiano	Síntomas	Vacuna
Bellatrix	El periodo de incubación típico es de 1 a 4 días (promedio: 2 días). La mayoría de los adultos puede contagiar a otros a partir del 1° día antes de que los síntomas se desarrollen y hasta 5 a 7 días después del inicio de la enfermedad.Los síntomas incluyen fiebre alta, superior a 38 ºC, pérdida de apetito, tos seca y profunda, cansancio, malestar general, dolores de cabeza, dolor de garganta, diarrea y, en ciertas ocasiones, vómitos.	Existe una vacuna para una enfermedad similar y en caso de pandemia se recomienda su uso en la población de riesgo. Se administra en una sola dosis y es inyectable
Paige	Desde el momento de la infección hasta que aparecen los primeros síntomas transcurren de 2 a 12 semanas aproximadamente. Los síntomas incluyen tos productiva que dura 3 semanas o más; tos con sangre o esputo (el esputo suele ser amarillo o verde), dolores torácicos, debilidad o cansancio pérdida de peso fiebre, malestar general, sudores nocturnos. escalofríos, pérdida del apetito, y dificultad para respirar	Existe vacuna contra esta enfermedad, aunque no suele estar incluido en el calendario español de vacunación. Es una inyección intradérmica en el brazo. Aquí puedes ver las enfermedades incluidas en el calendario de vacunación