


Етапи	Послідовність дій	Обґрунтування
Початковий етап	1. Психологічно підготувати пацієнта до маніпуляції	Встановлення контакту з пацієнтом
	2. Отримати згоду на її проведення	Дотримується право пацієнта на інформацію
	3. Уточнити індивідуальну чутливість до препарату	Забезп. профілактика ускладнень
	4. Підготувати оснащення	Забезпечується швидке й ефективне проведення процедури
	5. Здійснити гігієнічну обробку рук, надіти маску і рукавички	Забезпечується інфекційна безпека
	6. Звірити напис на упаковці з листом призначення (назва, концентрація, кількість, термін придатності)	Забезпечується попередження помилкового введення ліків, правильність дозування
Основний етап	1. Підготувати інсуліновий шприц та флакон з інсуліном до виконання ін'єкції. Набрати інсулін із флакона (після протирання гумової кришки спиртом, дати спирту висохнути) відповідно до призначеної дози, враховуючи, що в 1 мл міститься 40 чи 100 ОД інсуліну (звірити із флаконом)	Пам'ятайте! Доза інсуліну повинна бути набрана точно! При передозуванні інсуліну може виникнути зниження вмісту цукру в крові – гіпоглікемічна кома. При недостатньому введенні інсуліну може виникнути діабетична кома
	2. Допомогти пацієнту зайняти зручне положення	Забезпечується виконання процедури
	3. Обробити місце ін'єкції двічі ватними кульками, змоченими в спирті, дати спирту висохнути	Забезпечується інфекційна безпека Забезпечується ефективне виконання процедури, оскільки спирт інактивує інсулін
	4. Обробити рукавички двома кульками, змоченими спиртом	Забезпечується інфекційна безпека
	5. Видалити залишки повітря з шприца	Забезпечується профілактика ускладнення
	6. Захопити вказівним та великим пальцями лівої руки шкіру з підшкірною основою у ділянці ін'єкції	Запам'ятайте! Місце введення інсуліну необхідно змінювати кожного разу, тому що при постійному введенні препарату в одне і те ж місце можуть виникнути ускладнення – жирова дистрофія підшкірної основи – ліподистрофія

	 		
	7. Ввести в основу утвореної складки голку на 2/3 її довжини під кутом 30-45° (якщо довжина голки 10 мм, то під кутом 90°)	Забезпечується дотримання методики введення	
	8. Відпустити складку і повільно ввести ліки	Забезпечується дотримання методики введення	
	9. Прикласти суху стерильну ватну кульку до місця ін'єкції	Забезпечується інфекційна безпека	
	10. Витягнути швидким рухом голку	Забезпечується зменшення болю	
	11. Запитати у пацієнта про його самопочуття	Попередження ускладнення	
Завершальний етап	1.Продезінфікувати використане оснащення	Забезпечується інфекційна безпека	
	2. Зняти рукавички і маску, покласти у водонепроникний мішок. Вимити і висушити руки	Забезпечується інфекційна безпека	
	3. Зробити запис про проведення процедури та реакцію на неї пацієнта у відповідну медичну документацію	Забезпечується документування процедури	