

របាយការណ៍ទី១. ការបញ្ចូលសត្វ

បញ្ចូលរាយមុខ	តម្លៃ
ចំណងជើង	ឧទាហរណ៍
ទម្ងន់ដំបូង (គីឡូក្រាម) (kg)	300
ទម្ងន់បញ្ចប់ (គីឡូក្រាម) (kg)	500
កំណើនប្រចាំថ្ងៃ (kg)	0.45
ចំណាយលើអង្ករកម្មក្រៅពីចំណី (\$/ថ្ងៃ) (\$/day)	0
កែតម្រូវលើការសិទ្ធិលចំណី (-/+) (%)	0
កែតម្រូវលើការទ្រទ្រង់រាងកាយ (-/+) (%)	0
ពិន្ទុដងខ្លួនសត្វ	5. មធ្យម
កំណើនសំណង់	ទេ
ពូជ	Holstein
គ្រោងត្រីគាត	មធ្យម
ភេទ	គោឈ្មោល រុក្ខវ
អាយុ	អាយុមួយឆ្នាំ
សារធាតុជំរុញការផ្គុំធាតុ	ទេ
សារធាតុបន្ថែម	គ្មាន
សីតុណ្ហភាព	ធម្មតា
ជីវិត	គ្មាន

របាយការណ៍ទី២. ការបំភាយឧស្ម័នមេតាន

រាយមុខ	តម្លៃ
ការបំភាយឧស្ម័នមេតានជាមេកាហ្សែលក្នុង១ថ្ងៃក្នុងមួយក្បាល (MJ/ថ្ងៃ)	7.193
ការបំភាយឧស្ម័នមេតានជាមេកាគីឡូក្រាមក្នុង១ថ្ងៃក្នុងមួយក្បាល (Mcal/ថ្ងៃ)	1.719
ការបំភាយឧស្ម័នមេតានជាក្រាមក្នុង១ថ្ងៃក្នុងមួយក្បាល (g/ថ្ងៃ)	129.365
ការបំភាយឧស្ម័នមេតានជាក្រាមក្នុងមួយគីឡូក្រាមនៃចំណីសុទ្ធលជាម៉ាសស្មុត (ក្រាម/គីឡូក្រាម)	16.746
អត្រាបំបែកមេតាន (%)	5.366

១) អត្រាបំបែកមេតានគឺជាចំណែកនៃថាមពលសរុបក្នុងប្រព័ន្ធអាហារដែលបានបំបែកទៅជាមេតាន(ភាគរយ)។

គម្លាតឆ្លងតា ២ ទៅ ១២៖

៣.៥ កំរិតទាបខ្លាំងណាស់

៥.៥ កំរិតទាបណាស់

៥.៥ ទាប

៦.៥ មធ្យម

៧.៥ ខ្ពស់

៨.៥ ខ្ពស់ណាស់

៩.៥ ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់

របាយការណ៍ ០៣. សមាសភាពរូបមន្តចំណី៖ ចំណីសរសៃរ និង ចំណីសម្រេច
របាយការណ៍ ០៣-១. ចំណីសរសៃរ

បណ្ណាល័យ	លេខចំណី	ឈ្មោះចំណី	AMT_AF គីឡូក្រាម	AMT_DM គីឡូក្រាម	DE មេហ្គាកាឡូរី	CP គីឡូក្រាម	CF គីឡូក្រាម
0	10	ចំប៉ែងអាល់ហ្វាល់ហ្វា	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	30	សំបកផ្ទៃកខាងក្រៅអាល់ម៉ូន សរសៃរ15%	6.914330	6.222897	14.188	0.131	0.933
0	399	ចំប៉ែងOATដំណាក់កាលគ្រាប់ដាក់ម្សៅ	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	563	អង្កាម	0.567462	0.522065	0.277	0.017	0.224
			7.482	6.745	14.465	0.148	1.157

របាយការណ៍ ០៣-២. ចំណីសម្រេច

បណ្ណាល័យ	លេខចំណី	ឈ្មោះចំណី	AMT_AF គីឡូក្រាម	AMT_DM គីឡូក្រាម	DE មេហ្គាកាឡូរី	CP គីឡូក្រាម	CF គីឡូក្រាម
0	154	គ្រាប់BUCKWHEAT	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	162	កាល់ស្យូមដូស្វាតឌី	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	231	គ្រាប់ពោតចំណិតស្លែង	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	267	FAT animal Hydroponic	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	283	ត្រី ANCHOVYចំណីញ៉ាំងដោយម៉ាស៊ីន	1.065139	0.979928	3.414	0.698	0.011
0	430	ម្សៅសំបកងារខ្យង	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	675	អ៊ុយរ៉េ អាសូត45%	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	692	គ្រាប់ស្រូវសាលីក្រហមដាំក្នុងរដូវវស្សា	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
			1.065	0.980	3.414	0.698	0.011

របាយការណ៍ ០៣-៣. សរុបក្នុងរូបមន្តចំណី

បណ្ណាល័យ	លេខចំណី	ឈ្មោះចំណី	AMT_AF គីឡូក្រាម	AMT_DM គីឡូក្រាម	DE មេហ្គាកាឡូរី	CP គីឡូក្រាម	CF គីឡូក្រាម
0	10	ចំប៉ែងអាល់ហ្វាល់ហ្វា	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	30	សំបកផ្ទៃកខាងក្រៅអាល់ម៉ូន សរសៃរ15%	6.914330	6.222897	14.188	0.131	0.933

0	154	គ្រាប់BUCKWHEAT	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	162	កាល់ស្យូមផ្លូរីតឌី	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	231	គ្រាប់ពោតចំណិតស្នែង	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	267	FAT animal Hydroponic	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	283	ត្រី ANCHOVYចំណីដោយម៉ាស៊ីន	1.065139	0.979928	3.414	0.698	0.011
0	399	ចំបើងOATដំណាក់កាល គ្រាប់ដាក់ម្សៅ	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	430	ម្សៅសំបកដាវខ្យង	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	563	អង្កាម	0.567462	0.522065	0.277	0.017	0.224
0	675	អ៊ុយរ៉េ អាសូត45%	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
0	692	គ្រាប់ស្រូវសាលីក្រហមដាំ ក្នុងរដូវរងា	0.000000	0.000000	0.000	0.000	0.000
			8.547	7.725	17.879	0.846	1.168

របាយការណ៍ ០៤. សមាសភាពរូបមន្តចំណី៖ ចំណីទាំងអស់

បណ្ណាល័យ	លេខចំណី	ឈ្មោះចំណី	ចំណីស្ករចូលជាម៉ាសស្ករ គីឡូក្រាម	ចំណីស្ករចូលជាម៉ាសស្ករ %	ចំណីស្ករចូលជាស្រូវ គីឡូក្រាម	ចំណីស្ករចូលជាស្រូវ %
0	10	ចំបើងអាល់ហ្វាល់ហ្វា	0.000000	0.000000	0.000000	0.00
0	30	សំបកផ្ទៃកខាងក្រៅអាល់ម៉ូន សរសៃ15%	6.222897	80.556449	6.914330	80.8
0	154	គ្រាប់BUCKWHEAT	0.000000	0.000000	0.000000	0.00
0	162	កាល់ស្យូមផ្លូអ៊ីតឌី	0.000000	0.000000	0.000000	0.00
0	231	គ្រាប់ពោតចំណីតស្លែង	0.000000	0.000000	0.000000	0.00
0	267	FAT animal Hydroponic	0.000000	0.000000	0.000000	0.00
0	283	ត្រី ANCHOVYចំណីដោយម៉ាស៊ីន	0.979928	12.685331	1.065139	12.4
0	399	ចំបើងOATដំណាក់កាលគ្រាប់ដាក់ ម្សៅ	0.000000	0.000000	0.000000	0.00
0	430	ម្សៅសំបកងារខ្យង	0.000000	0.000000	0.000000	0.00
0	563	អង្កាម	0.522065	6.758220	0.567462	6.6
0	675	អ៊ុយរ៉េ អាសូត45%	0.000000	0.000000	0.000000	0.00
0	692	គ្រាប់ស្រូវសាលក្រហមដាក់ក្នុងរដូវរងា	0.000000	0.000000	0.000000	0.00
			7.72	100.00	8.55	1

របាយការណ៍ ០៥. គម្លាតតម្លៃ និងចំណីមិនត្រូវបានប្រើ
របាយការណ៍ ០៥_១. ចំណីដែលប្រើក្នុងរូបមន្ត

បណ្ណាល័យ	លេខចំណី	ឈ្មោះ	ចំនួនគីឡូក្រាមស្រស់	តម្លៃនៅពេលធ្វើរូបមន្តចំណី ទ/តោនស្រស់	តម្លៃទាបជាង ទ/តោនស្រស់
0	30	សំបកផ្ទៃកខាងក្រៅអាស់ម៉ុន សរសៃ15%	6.914330	32.67	
0	283	ត្រី ANCHOVYចំណីដោយម៉ាស៊ីន	1.065139	88.18	
0	563	អង្កាម	0.567462	0.00	

របាយការណ៍ ០៥_២. ចំណីដែលមិនបានប្រើក្នុងរូបមន្ត

បណ្ណាល័យ	លេខចំណី	ឈ្មោះ	តម្លៃនៅពេលធ្វើរូបមន្តចំណី ទ/តោនស្រស់	តម្លៃគណនាដោយកម្មវិធី ទ/តោនស្រស់
0	10	ចំបើងអាស់ហ្គាល់ហ្គា	137.70	36.39
0	154	គ្រាប់BUCKWHEAT	110.23	56.59
0	162	កាល់ស្យូមផូស្វាតឌី	529.10	-1.30
0	231	គ្រាប់ពោតចំណីតស្លែង	132.00	78.34
0	267	FAT animal Hydroponic	264.55	207.23
0	399	ចំបើងOATដំណាក់កាលគ្រាប់ដាក់ ម្សៅ	110.23	37.64
0	430	ម្សៅសំបកងារខ្យង	110.23	-1.32
0	675	អ៊ុយរ៉េ អាសូត45%	256.55	9.94
0	692	គ្រាប់ស្រូវសាលីក្រហមដាំក្នុងរដូវវស្សា	137.78	72.17

របាយការណ៍ ០៦. ការវិភាគសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុង ១០០% ជាម៉ាសស្ងួត

សារធាតុចិញ្ចឹម	ឈ្មោះ បង្ហាញ	បរិមាណ	ឯកតា		អ្នកប្រើប្រាស់ អប្បបរមា	អ្នកប្រើប្រាស់ អប្បបរមា
DM	ម៉ាសស្ងួតចំណី	90.382	% ម៉ាសស្ងួត			
		7.725	គីឡូក្រាម	* *	7.725	
DE	ថាមពលដែលបាន រំលាយ	2.314	មេហ្គាកាឡូរី/គីឡូក្រាម			
		17.879	មេហ្គាកាឡូរី			
ME	ថាមពលបណ្តូប ធាតុ	1.898	មេហ្គាកាឡូរី/គីឡូក្រាម			
		14.662	មេហ្គាកាឡូរី			
NEM	ថាមពលសុទ្ធសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយ	1.070	មេហ្គាកាឡូរី/គីឡូក្រាម		1.070	
		8.269	មេហ្គាកាឡូរី	*		
NEG	ថាមពលសុទ្ធសម្រាប់លូតលាស់	0.545	មេហ្គាកាឡូរី/គីឡូក្រាម			
		4.207	មេហ្គាកាឡូរី			
TDN	សារធាតុចិញ្ចឹមសរុបដែលបានរំលាយ	52.722	% ម៉ាសស្ងួត			
		4.073	គីឡូក្រាម			
CP	ប្រូតេអ៊ីន	10.947	% ម៉ាសស្ងួត		10.947	
		0.846	គីឡូក្រាម	*		
UIP	ប្រូតេអ៊ីនស៊ីច្ចូលមិនបំបែក	1.516	% ម៉ាសស្ងួត			
		0.117	គីឡូក្រាម			
DIP	ប្រូតេអ៊ីនស៊ីច្ចូលបានបំបែក	9.159	% ម៉ាសស្ងួត			
		0.708	គីឡូក្រាម			
NPN	អាសូតដែលបំបែកជាប្រូតេអ៊ីនដោយមីក្រូសារពាង្គកាយ (NPN)	0.000	% ម៉ាសស្ងួត			
		0.000	គីឡូក្រាម			

EE	ខ្លាញ់ ឬ ប្រេង	3.042	% ម៉ាសស្មុត			
		0.235	គីឡូក្រាម			
ASH	ផេះ	8.671	% ម៉ាសស្មុត			
		0.670	គីឡូក្រាម			
CF	ជាតិសរសៃ (CF)	15.122	% ម៉ាសស្មុត			
		1.168	គីឡូក្រាម			
CELL	សែលុយឡូស	17.536	% ម៉ាសស្មុត			
		1.355	គីឡូក្រាម			
ADF	ជាតិសរសៃ(ADF)	27.422	% ម៉ាសស្មុត			
		2.118	គីឡូក្រាម			
NDF	ជាតិសរសៃ(NDF)	31.320	% ម៉ាសស្មុត			
		2.419	គីឡូក្រាម			
NCHO	កាបូអ៊ីដ្រាតដែល ងាយរលាយ	0.000	% ម៉ាសស្មុត			
		0.000	គីឡូក្រាម			
HC	ហៃមីសែលលូឡូស	0.000	% ម៉ាសស្មុត			
		0.000	គីឡូក្រាម			
LIGN	លីហ្គីនីន	8.331	% ម៉ាសស្មុត			
		0.644	គីឡូក្រាម			
CA	កាល់ស្យូម	0.710	% ម៉ាសស្មុត		0.381	
		0.055	គីឡូក្រាម			
CL	ក្លរីន	0.142	% ម៉ាសស្មុត			
		0.011	គីឡូក្រាម			
MG	ម៉ាញ៉េស្យូម	0.195	% ម៉ាសស្មុត			
		0.015	គីឡូក្រាម			
P	ផូស្វ័រ	0.437	% ម៉ាសស្មុត		0.242	
		0.034	គីឡូក្រាម			
K	ប៉ូតាស្យូម	0.564	% ម៉ាសស្មុត			
		0.044	គីឡូក្រាម			
NA	សូដ្យូម	0.145	% ម៉ាសស្មុត			
		0.011	គីឡូក្រាម			
S	ស្វ័យផ័រ	0.201	%			

			ម៉ាសស្មុត		
		0.016	គីឡូក្រាម		
CO	កូប៉ាល	0.266	ppm		
		2.053	មីលីក្រាម		
CU	ទង់ដែង	10.130	ppm		
		78.251	មីលីក្រាម		
I	អ៊ីយ៉ូដ	0.433	ppm		
		3.342	មីលីក្រាម		
FE	ដែក	272.539	ppm		
		2105.335	មីលីក្រាម		
MN	ម៉ង់កាណែស	41.012	ppm		
		316.810	មីលីក្រាម		
SE	សេលេញ៉ូម	0.186	ppm		
		1.440	មីលីក្រាម		
ZN	ស័ង្កសី	33.795	ppm		
		261.061	មីលីក្រាម		
VITA	វីតាមីន អា	0.000	K IU/គីឡូក្រាម		
		0.000	K IU		
VITD	វីតាមីន ដេ	0.000	K IU/គីឡូក្រាម		
		0.000	K IU		
VITE	វីតាមីន អ៊ី	0.635	IU/គីឡូក្រាម		
		4.903	IU		
ARGI	អាហ្គីនីន	0.478	% ម៉ាសស្មុត		
		0.037	គីឡូក្រាម		
HIST	ហ៊ីស្តីឌីន	0.204	% ម៉ាសស្មុត		
		0.016	គីឡូក្រាម		
LYSI	លីស៊ីន	0.639	% ម៉ាសស្មុត		
		0.049	គីឡូក្រាម		
METH	ម៉េត្យូនីន	0.241	% ម៉ាសស្មុត		
		0.019	គីឡូក្រាម		
PHEN	ផេនីលអាឡានីន	0.353	% ម៉ាសស្មុត		
		0.027	គីឡូក្រាម		
THRE	ត្រីអ៊ូនីន	0.350	% ម៉ាសស្មុត		
		0.027	គីឡូក្រាម		

ázŸázŋázšáz'ázŋáz áž»áz...áz·áz%áoáŸ'áz...áz'áz~ázšázŸ,áz'ázŸáz~ázŸ'áz,ázŋáz'ázŸ'ázšázŸ,,áz™áz•
áŸ'áz€ázŋáz™áz áŸ,áz~áz½áz™ (*)
áz~áz·áz"áz"áŸ†áz-áŸ áž%áoáz ážŋáz~áz€áz~ázŸ'ázšáz·áz ážćáz"ázŸ'áz"áz"ázšáz~ázŋázšázŸ,áz'áz•
áŸ'áz áž'ázŸ'ázćáz"áz»ázŸázŋázŸáz"áŸ ážšázŸ,,áz™ UCD
áz áŸ†ázšáz¼ázœáz€ázŋázšázŸázŋázšáz'ázŋáz áž»áz...áz·áz%áoáŸ'áz...áz'áz~ázšázž"ázŸázŸ Dairy
Cattle áž"áŸ,,áŸ†áz'áŸ áŸ"
ázŸázŋázšáz'ázŋáz áž»áz...áz·áz%áoáŸ'áz...áz'áz~ázšázŸ,áz'ázŸáz~ázŸ'áz,ázŋáz'ázŸ'ázšázŸ,,áz™áz•
áŸ'áz€ázŋáz™áz'ázŸ'ázœázŸ (**)
áz'áz¼ázŸáz-áz,áz€áz~ázŸ'ázšáz·áz ážćáz áž·áz"ázšáz~ázŋázšázŸ,áz'áz•ázŸ'áz áž'ázŸ'ázćáz"áz»áz
žŸázŋázŸáz"áŸ ážšázŸ,,áz™ UCD
ázŸázŋázšáz'ázŋáz áž»áz...áz·áz%áoáŸ'áz...áz'áz~áz"ázŸfáz'áz'áz€ázšázŸ,,áŸ†áz,ázŸ,,áz†áz¼ázšázŸ
ázŋáz...ázŸ'áz,ázŸ,ázŸ"

របាយការណ៍ ០៨. ការវិភាគថាមពល និងប្រូតេអ៊ីនចំណី

បណ្ណាល័យ	លេខចំណី	ឈ្មោះចំណី	DE Mcal/kg	ME Mcal/kg	NEM Mcal/kg	NEG Mcal/kg	TDN % DM	
0	10	ថ្នាំបំប៉នអាសូរហ្វូស្វ័រ	2.21	1.81	0.97	0.42	50.00	
0	30	សំបកផ្ទៃកខាងក្រៅអាសូរម៉ូន សរសៃរ15%	2.28	1.87	1.03	0.48	52.00	
0	154	គ្រាប់BUCKWHEAT	3.17	2.60	1.69	1.08	72.00	
0	162	កាលស្រម្រជួស្មាតឌី	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	231	គ្រាប់ពោតចំណិតស្លែង	4.19	3.44	2.38	1.67	88.00	
0	267	FAT animal Hydroponic	8.40	7.56	5.89	4.41	177.00	
0	283	ត្រី ANCHOVYចំណីរុក្ខជាតិដោយម៉ាស៊ីន	3.48	2.86	1.91	1.27	79.00	
0	399	ថ្នាំបំប៉នOATដំណាក់កាលគ្រាប់ដាក់ម្សៅ	2.34	1.92	1.08	0.52	53.00	
0	430	ម្សៅសំបកដាវខ្មែរ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	563	អង្កាម	0.53	0.44	0.00	0.00	12.00	
0	675	អ៊ុយរ៉េ អាសូត45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	692	គ្រាប់ស្រូវសាលីក្រហមដាំក្នុងរដូវវស្សា	3.92	3.22	2.21	1.52	89.00	

របាយការណ៍ ០៩. ការវិភាគវិធាន និងសមាសធាតុគីមីចំណី

បណ្ណាល័យ	លេខចំណី	ឈ្មោះចំណី	EE % DM	ASH % DM	CF % DM	CELL % DM	ADF % DM	
0	10	ចំបើងអាល់ហ្គាល់ហ្គា	1.80	0.00	27.90	0.00	0.00	
0	30	សំបកផ្ទៃកខាងក្រៅអាល់ម៉ូន សរសៃរ15%	3.00	6.50	15.00	19.00	28.00	
0	154	គ្រាប់BUCKWHEAT	2.80	2.30	11.80	0.00	0.00	
0	162	កាល់ស្យូមផ្លូស្វាតឌី	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	231	គ្រាប់ពោតចំណិតស្លែង	4.30	1.60	2.60	2.00	2.70	
0	267	FAT animal Hydroponic	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	283	ត្រី ANCHOVYចំរាញ់ដោយម៉ាស៊ីន	4.50	16.10	1.10	0.00	0.00	
0	399	ចំបើងOATដំណាក់កាលគ្រាប់ដាក់ម្សៅ	4.20	6.90	27.00	24.00	34.00	
0	430	ម្សៅសំបកដាវខ្មែរ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	563	អង្កាម	0.80	20.60	42.90	33.00	72.00	
0	675	អ៊ុយរ៉េ អាសូត45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	692	គ្រាប់ស្រូវសាលីក្រហមដាំក្នុងរដូវវស្សា	1.80	2.10	2.40	0.00	0.00	

របាយការណ៍ ១០. ការវិភាគម៉ាត្រូឌនិងនៃចំណី

បណ្ណាល័យ	លេខចំណី	ឈ្មោះចំណី	CA % DM	CL % DM	MG % DM	P % DM	K % DM	
0	10	ចំបើងអាល់ហ្គាល់ហ្គា	1.56	0.00	0.00	0.29	1.60	
0	30	សំបកផ្ទៃកខាងក្រៅអាល់ម៉ូន សរសៃរ15%	0.23	0.00	0.13	0.11	0.53	
0	154	គ្រាប់BUCKWHEAT	0.11	0.05	0.12	0.37	0.51	
0	162	កាលស្រម្រជួស្មាតឌី	22.00	0.00	0.59	19.30	0.07	
0	231	គ្រាប់ពោតចំណិតស្លែង	0.03	0.05	0.14	0.29	0.37	
0	267	FAT animal Hydroponic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	283	ត្រី ANCHOVYចំរាញ់ដោយម៉ាស៊ីន	4.08	1.08	0.27	2.70	0.78	
0	399	ចំបើងOATដំណាក់កាលគ្រាប់ដាក់ម្សៅ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	430	ម្សៅសំបកដាវខ្មែរ	38.00	0.01	0.30	0.07	0.10	
0	563	អង្កាម	0.10	0.08	0.83	0.08	0.57	
0	675	អ៊ុយរ៉េ អាសូត45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	692	គ្រាប់ស្រូវសាលីក្រហមដាំក្នុងរដូវវស្សា	0.05	0.08	0.11	0.30	0.46	

របាយការណ៍ ១១. ការវិភាគមីក្រូឧស្ម័ននៃចំណី

បណ្ណាល័យ	លេខចំណី	ឈ្មោះចំណី	CO ppm	CU ppm	I ppm	FE ppm	MN ppm	
0	10	ថ្នាំបង្កើនអាសូរហ្វូស្វ័រ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	30	សំបកផ្ទៃកខាងក្រៅអាសូរម៉ូន សរសៃរ15%	0.30	11.00	0.00	301.00	21.00	
0	154	គ្រាប់BUCKWHEAT	0.06	11.00	0.00	50.00	38.00	
0	162	កាល់ស្យូមផ្លូអ្វីស្ទាតឌី	10.00	10.00	0.00	14400.00	300.00	
0	231	គ្រាប់ពោតចំណីតស្លែង	0.05	4.00	0.00	30.00	5.00	
0	267	FAT animal Hydroponic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	283	ត្រី ANCHOVYចំណីរុក្ខជាតិដោយម៉ាស៊ីន	0.19	10.00	3.41	237.00	12.00	
0	399	ថ្នាំបង្កើនOATដំណាក់កាលគ្រាប់ដាក់ម្សៅ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	430	ម្សៅសំបកដាវឌុប	0.00	0.00	0.00	2870.00	100.00	
0	563	អង្កាម	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	
0	675	អ៊ុយរ៉េ អាសូត45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	692	គ្រាប់ស្រូវសាលីក្រហមដាំក្នុងរដូវវស្សា	0.12	7.00	0.00	30.00	36.00	

របាយការណ៍ ១២. ការវិភាគសារធាតុចិញ្ចឹមចំណីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

បណ្ណាល័យ	លេខចំណី	ឈ្មោះចំណី	VITA k IU/kg	VITD k IU/kg	VITE k IU/kg	ARGI % DM	HIST % DM	
0	10	ថ្នាំបង្កើនអាសូរហ្វូស្វ័រ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	30	សំបកផ្ទៃកខ្វក់ក្រៅអាសូរម៉ូន សរសៃរ15%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	154	គ្រាប់BUCKWHEAT	0.00	0.00	0.00	0.98	0.26	
0	162	កាលស្រម្រជួសស្លាតឌី	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	231	គ្រាប់ពោតចំណិតស្លែង	1.00	0.00	25.01	0.44	0.28	
0	267	FAT animal Hydroponic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	283	ត្រី ANCHOVYចំណីរុក្ខជាតិដោយម៉ាស៊ីន	0.00	0.00	5.00	3.77	1.61	
0	399	ថ្នាំបង្កើនOATដំណាក់កាលគ្រាប់ដាក់ម្សៅ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	430	ម្សៅសំបកដាវខ្មែរ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	563	អង្កាម	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	675	អ៊ុយរ៉េ អាសូត45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	692	គ្រាប់ស្រូវសាលីក្រហមដាំក្នុងរដូវវស្សា	0.00	0.00	18.01	0.65	0.32	