

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період 12–18 травня 2023 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь – початок трубкування. Озимий ріпак –цвітіння. Соняшник – сходи. Горох – поява бокових пагонів. Картопля – сходи. Сад – цвітіння.

Протягом звітного періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці злаковими блішками за середньої чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 52 % обстежених площ, хлібними клопами за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 15 % обстежених площ, середня чисельність яйцекладок шкідника 1 екз. на кв.м на 10 % обстежених площ, злаковими попелицями за середньої чисельності 3 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 3 % рослин на 59 % обстежених площ, хлібною п'явицею за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 27 % обстежених площ, середня чисельність яйцекладок шкідника 0,3 екз. на кв.м на 3 % обстежених площ. В теплі сонячні дні у посівах озимої пшениці спостерігається літ злакових мух: гессенська муха в середньому 19 екз. на 100 п.с., шведські мухи в середньому 7 екз. на 100 п.с., пшенична муха в середньому 12 екз. на 100 п.с. на 35-52 % від обстежених площ, злаковими цикадами в середній чисельності 2 екз. на 100 п.с. заселено 33 % обстежених площ. Борошнистою росю уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 18 % обстежених площ, бурю іржею уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 25 % обстежених площ, септоріозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 67 % обстежених площ, піренофорозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 9 % обстежених площ (1825 га).

В посівах озимого ячменю злаковими блішками за середньої чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 8 % рослин на 34 % обстежених площ, злаковими попелицями за середньої чисельності 3 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 3 % рослин на 49 % обстежених площ. В теплі сонячні дні у посівах озимого ячменю спостерігається літ злакових мух: гессенська муха в середньому 20 екз. на 100 п.с., шведські мухи в середньому 16 екз. на 100 п.с., пшенична муха в середньому 14 екз. на 100 п.с. на 66 % від обстежених площ (182 га).

В посівах ячменю хлібною п'явицею за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 100 % обстежених площ, злаковими блішками за середньої чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 100 % обстежених площ. Гельмінтоспоріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 100 % обстежених площ (40 га).

В посівах озимого ріпаку хрестоцвітими блішками за середньої чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 24 % обстежених площ, капустяним стебловим прихованохоботником за середньої

чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 10 % обстежених площ, ріпаковим насіннєвим прихованохоботником в середній чисельності 1,4 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 5 % рослин на 43 % обстежених площ; оленкою волохатою в середній чисельності 1,4 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 91 % обстежених площ, ріпаковим квіткоїдом в середній чисельності 1,7 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 5 % рослин на 29 % обстежених площ. Альтернاریозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 33 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 19 % обстежених площ, циліндроспоріозом уражено 1 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 17 % обстежених площ (909 га).

В посівах гороху бульбичковими довгоносіками за середньої чисельності 1,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 36 % обстежених площ, піщаним мідляком за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 100 % обстежених площ (202 га).

В посівах соняшнику дротяниками в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 39 % обстежених площ, піщаним мідляком в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 100 % обстежених площ (221 га).

Колорадським жуком в середній чисельності 2 екз. на кущ заселено і пошкоджено 30 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 5 % кущів (присадибні ділянки).

В плодівих садах яблуневою міллю заселено 10 % дерев в середній чисельності 1 гніздо/дерево в середньому пошкоджено 1 % листків на 100 % площ (4 га).