


ТЕМА: Класифікація вуглеводнів.

Вуглеводні – речовини, що складаються тільки з Карбону і Гідрогену.



Насичені вуглеводні – це вуглеводні у молекулі яких атоми Карбону насычені атомами Гідрогену відповідно до їх валентностей. За міжнародною номенклатурою їх називають – АЛКАНИ.

Природніми джерелами вуглеводнів є поклади нафти і природнього газу.

ГОМОЛОГІЧНИЙ РЯД АЛКАНІВ

CH_4 – метан

C_2H_6 – етан

C_3H_8 – пропан

C_4H_{10} – бутан

C_5H_{12} – пентан

C_6H_{14} – гексан

C_7H_{16} – гептан

C_8H_{18} – октан

C_9H_{20} – нонан

$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ – декан

$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$

Дуже важливо, щоб кожна хімічна речовина мала своє власне ім'я. Із цією метою хіміки розробили спеціальну систему правил – номенклатуру. Ці правила називають систематичною номенклатурою, вони розроблені товариством IUPAC (українською «юпак») і ними користуються хіміки всього світу.

Ми з вами будемо називати органічні сполуки за допомогою алгоритму.

АЛГОРИТМ НАПИСАННЯ НАЗВ АЛКАНІВ

1. Вибираємо у формулі найдовший ланцюг з атомів Карбону і нумеруємо кожен атом, починаючи з того боку до якого більше розташований замісник.
2. Вказуємо номер атома Карбону, який сполучений із замісником (якщо у формулі є два одинакових замісники, то ми їх записуємо за допомогою множинних префіксів).

Множинні префікси

ди –2
три –3
тетра – 4
пенто –5
гексо –6


3. Називаємо замісник .

Найпоширеніші замісники


бром Br
етил C_2H_5
пропіл C_3H_7
хлор Cl
флуор F

4. Називаємо алкан, якому відповідає загальна кількість атомів Карбону у визначеному ланцюзі.


Наприклад, у нас є формула, якій потрібно дати назву




Згідно першого правила ми обираємо найдовший ланцюг атомів Карбону і нумеруємо їх, починаючи зі сторони, до якої більше розташований замісник




Вказуємо номер атома Карбону, біля якого розташований замісник.



Називаємо замісник.




Називаємо алкан, якому відповідає загальна кількість атомів Карбону в обраному ланцюзі.






3 – метилгексан


Надамо назву ще одному вуглеводню.




Обираємо найдовший ланцюг атомів Карбону і нумеруємо їх, починаючи зі сторони, до якої ближче розташований замісник




Вказуємо номер атома Карбону, біля якого розташований замісник. Так, як у нас у даній формулі розташовані два замісники, біля одного атома Карбону, то ми цю цифру записуємо двічі.



Називаємо замісник. Так, як у нас у даній формулі розташовані два одинакові замісники, то ми перед назвою замісника записуємо відповідний множинний префікс – ди.




Називаємо алкан, якому відповідає загальна кількість атомів Карбону в обраному ланцюзі.




2,2–диметилгексан

Складати формулу вуглеводню за його назвою, це зворотній процес.


Наприклад, у нас є вуглеводень, який має певну назву, нам потрібно записати його формулу.




Звертаємо увагу на закінчення назви



Гексан має шість атомів карбону і ми записуємо їх у вигляді ланцюга.



Звертаємо увагу, що замісники розташовані біля 3 атома Карбону – Br, а біля 2 і 4 – два метили. Отже записуємо і їх.



Записуємо у головному ланцюзі атоми Гідрогену, відповідно до валентності Карбону.

