

Commentaires de Droit au Corps sur l'article [A quel âge décalotter bébé et comment s'y prendre ?](#)

Consulté le 04/10/2020.

Note : la date de publication originale de l'article n'est pas claire. Il est indiqué « Mis à jour le 20 juillet 2020 » et « mis à jour le 19/08/20 ».

Contenu	Type de problème et commentaire
Journalistes : « Lorsque l'enfant n'est pas circoncis , le prépuce a tendance à recouvrir le gland »	argument spécieux Le choix de cette formulation interroge sur un biais des journalistes au sujet de la circoncision. À noter que cette phrase est un copier-coller d'un article de la blogueuse Coraly Cox, signalé dans l'Observatoire le 28/05/2020.
Journalistes : « [Le smegma] agit comme une sorte de colle , qui maintient le prépuce collé au gland. »	Se tromper sur le développement normal du pénis Le smegma possède des caractéristiques émollientes, à l'opposé de la colle. Le prépuce et le gland sont initialement fusionnés par un tissu épithélial commun. À noter là encore que cette phrase est un copier-coller d'un article de la blogueuse Coraly Cox, signalé dans l'Observatoire le 28/05/2020.
Dre Anne Boutemy : « Ces petites adhérences ne sont pas graves, on tire un petit peu dessus tous les jours dans le bain et cette colle finira par partir »	Se tromper sur le développement normal du pénis
Dre Anne Boutemy : « il faut savoir qu'il n'existe pas de consensus médical au sujet du décalottage, les recommandations varient d'un pédiatre à l'autre en fonction de l'expérience de chacun »	La science est pourtant claire : décalotter l'enfant est inutile et dangereux . Cette mauvaise pratique subsiste en raison d'une faillie de santé publique .
Dre Anne Boutemy : « À la visite des 24 mois, je regarde l'état du prépuce : soit il coulisse normalement sur le gland et ne présente pas de rétrécissement, auquel cas c'est normal, soit il y a des adhérences, c'est-à-dire que le prépuce est collé par endroits. Je conseille alors aux parents de commencer à tirer tout doucement sur la peau du prépuce sans forcer pour faire l'hygiène du gland, les adhérences vont se lever progressivement jusqu'à la puberté »	Se tromper sur le développement normal du pénis Préconiser ou tenter de décalotter l'enfant Préconiser ou pratiquer une mauvaise hygiène du pénis
Journalistes : « Il est conseillé de procéder petit à petit, pour gagner 1 mm au fur et à mesure des bains (en moyenne une à deux fois par semaine), de façon à ce que l'enfant puisse être complètement décalotté. Si le décalottage n'est pas complet, il est possible que les adhérences perdurent durant l'enfance »	Se tromper sur le développement normal du pénis Préconiser ou tenter de décalotter l'enfant À noter que la première phrase est en grande partie un copier-coller d'un article de la blogueuse Coraly Cox, signalé dans l'Observatoire le 28/05/2020.
Une question de Léa, une maman, est citée : « Mon fils a 4 ans, il a été décalotté lors de ses 3 ans, tout se passait bien et là depuis quelques jours, il n'arrive plus à se décalotter tout seul et moi non plus je n'y arrive pas. Quelqu'un aurait-il une solution ? »	Le plus probable est que les décalottages initiés à partir de 3 ans ont fini par provoquer des blessures, menant ainsi à une sténose préputiale .

Un lien renvoie vers le forum et on peut constater qu'une réponse de la rédaction a été apportée à Léa : « voici les conseils du docteur Eric Saban, pédiatre, qui a répondu à nos questions sur le décalottage. Il recommande de commencer à décalotter doucement dès 9 mois, et il est possible que des adhérences se forment pendant l'enfance si le décalottage n'a pas été fait complètement. C'est peut-être pour cette raison que vous rencontrez des difficultés avec votre enfant. »	Se tromper sur le développement normal du pénis Préconiser ou tenter de décalotter l'enfant
Dre Anne Boutemy : « Dès l'âge de 24 mois, je conseille aux parents de serrer le prépuce de manière ferme et délicate à la fois, après le bain, une fois que la peau est mouillée. Le but ? Assouplir la peau du gland. En faisant cela tous les jours pendant 2/3 ans, on finit par obtenir un bon résultat »	Se tromper sur le développement normal du pénis Surmédicaliser le pénis
Journalistes : « Si le résultat n'est toujours pas concluant au bout d'un certain temps, le Dr Anne Boutemy prescrit une crème à base de cortisone à appliquer entre le gland et le prépuce une fois par jour pendant un mois, tout en décalottant bien son enfant au moment du bain. » Dre Anne Boutemy : « Généralement, le traitement se révèle satisfaisant au bout d'un mois. Si malgré ça, on n'arrive toujours pas à décalotter, j'adresse mes patients à l'urologue qui va regarder le zizi et opérer si besoin pour enlever les adhérences ».	Surmédicaliser le pénis
Dr Eric Saban : « Petit à petit, ces adhérences risquent de progresser vers le bout du zizi »	Se tromper sur le développement normal du pénis
Dr Eric Saban : « Parfois, le prépuce est complètement refermé et les enfants ne peuvent plus uriner » « l'expérience montre que lorsqu'on ne les décalotte pas, des adhérences se forment et cela empêche les érections à un moment donné » « les jeunes peuvent avoir des érections douloureuses en raison de ces adhérences préputiales qui n'ont jamais été libérées »	Se tromper sur le développement normal du pénis De tels troubles ne sauraient être dus à une absence de décalottage de l'enfant par un tiers. La science est claire, décalotter l'enfant est inutile et dangereux .
Journalistes : « [Le Dr Saban] propose même aux parents de décalotter les enfants lors de la visite du 9e mois. » Dr Eric Saban : « Je demande aux parents d'appliquer la crème anesthésiante EMLA, une heure avant la consultation, entre le gland et le prépuce (tout autour) ». Journalistes : « Le professionnel de santé tire alors délicatement sur le prépuce pour le décoller. » Dr Eric Saban : « Il faut savoir que les garçons ont légèrement mal lorsqu'ils font pipi, pendant les deux jours qui suivent environ » Journalistes : C'est pourquoi il recommande d'appliquer de nouveau de la crème à chaque change, sur le bout du	Surmédicaliser le pénis Préconiser ou tenter de décalotter l'enfant Ce propos montre que le Dr Saban est conscient qu'il y aura lésion, et donc qu'il inflige une blessure.

zizi.	
Journalistes : « Il arrive parfois que le prépuce soit trop étroit et impossible à décalotter, même lorsqu'on force un peu. On parle alors de phimosis et il s'agit de la seule indication médicale pour pratiquer une circoncision. »	Se tromper sur le développement normal du pénis
Dr Eric Saban : « On arrive à des situations où les parents ont laissé s'installer des adhérences durant des mois, voire des années. Résultat : le prépuce est devenu tellement étroit que la seule alternative devient la circoncision » « Et c'est justement pour éviter d'en arriver à cela, qu'il faut les décalotter »	Se tromper sur le développement normal du pénis Préconiser ou pratiquer la circoncision à cause d'un diagnostic erroné de « phimosis » Préconiser ou pratiquer la circoncision en omettant de proposer une alternative moins invasive et dommageable Préconiser ou tenter de décalotter l'enfant
Journalistes : « Rappelons que la question du décalottage ne se pose pas pour les enfants circoncis, dans le cadre de leur religion, puisque une partie du prépuce a déjà été retiré <i>[sic]</i> . »	argument spécieux Cette phrase interroge à nouveau sur un biais des journalistes à l'égard de la circoncision. Pour les parents angoissés par la question du décalottage et qui ne risquent pas d'être rassurés par cet article catastrophique, une telle phrase peut constituer un élément déclencheur : certains risquent de faire circoncire leur fils pour se débarrasser d'un problème qui, en réalité, n'existe pas.