BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
KHOA DƯỢC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2023

THÔNG TIN THUỐC

V/v: Hướng dẫn sử dụng **Diazepam**

I. Chỉ định:

- Điều trị ngắn ngày trạng thái lo âu, mất ngủ
- Cơ co cứng do não hoặc do thần kinh ngoại biên
- Co giật do sốt cao, trạng thái động kinh, co giật do ngộ độc thuốc
- Tiền mê trước khi phẫu thuật

II. Liều dùng:

- ***Xử trí ngộ độc thuốc tê toàn thân***: Kiểm soát co giật **diazepam** 5 – 15 mg TMC
- ***Phác đồ Fetocide:*** dùng **diazepam** 5 mg 1 giờ trước thủ thuật
- ***Giảm đau trong triệt sản nam và nữ:*** uống 5mg **diazepam** 30 phút trước thủ thuật nếu bệnh nhân quá lo lắng

III. Cách dùng: Uống, tiêm tĩnh mạch

IV. Phụ nữ mang thai và cho con bú:

- Phụ nữ mang thai: Dữ liệu trên người gợi ý nguy cơ khi sử dụng ở 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kì
- Phụ nữ cho con bú: Dữ liệu trên người hạn chế - Có thể gây độc

V. Tên một số sản phẩm sử dụng tại Bệnh viện Hùng Vương:

- Diazepam 10mg/2ml (tiêm)
- Diazepam 5mg (uống)

Tài liệu tham khảo:

1) *Dược thư Quốc Gia Việt Nam 2022*
2) *Drugs in Pregnancy and Lactation*
3) *Hướng dẫn điều trị Bệnh viện Hùng Vương*

Tổ TTT-Dược lâm sàng **Khoa Dược**

Ds. Nguyễn Thanh Hoài Phong **Ds. Đoàn Thị Ngọc Hân**