chp38-4.判定【男女對於洗面乳選購的在意點】, 是否 男女有差異?

1.【請問】:這樣子的數據,該用什麼【統計檢定】?

???

因為x是二元類別, y是連續數值



2.【請問】:這個是【雙尾檢定,還是右尾檢定,還是左尾檢定】?

【男女對於洗面乳選購的在意點】, 是否男女有差異?, 屬於???檢定

單尾檢定 (左尾)	雙尾檢定	單尾檢定 (右尾)
$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu < \mu_0$	$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$	$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu > \mu_0$

- 3.【請問】:【男女對於洗面乳選購的在意點】,是否男女有差 異?的2種假設
- →H0**虚無假設/否定假設**:µ1 = µ2(無差異)
- →H1對立假設(肯定假設):µ1 ≠ µ2(有差異)
- 3.【高級觀念】:這個命題(選購洗面乳的在意分數,男女是否有 差異?),雙尾命題的命題就是真命題

(1)觀念:雙尾檢定的**命題**只有**1**種:是否有差異?

4.【檢定】:選購洗面乳的在意分數, 女生是否在意大過男生?

77.5			
420	: 9: F	統計	h-550
7	4.44	*****	110

	性別	Ν	平均值	標準差	標準誤平均值
抗痘	男	46	4.02	1.000	.147
	女	104	3.91	.936	.092
去油	男	46	4.15	.816	.120
	女	104	3.88	.938	.092
美白	男	46	3.11	1.016	.150
	女	104	4.05	.829	.081
保濕	男	46	3.28	.886	.131
	女	104	4.13	.764	.075
去角質	男	46	3.11	.994	.147
	女	104	3.46	.869	.085
緊緻毛孔	男	46	3.20	1.046	.154
	女	104	3.95	.840	.082
卸妝	男	46	2.30	1.072	.158
	女	104	3.50	1.123	.110

			$\overline{}$	獨立	江樣本檢定			
		變異數等式的	Levene 檢定			平均	平均值等式的 t 檢定	
		F	顯著性	t	自由度	顯著性 (雙 尾)	平均值差異	
抗痘	採用相等變異數	.062	.803	.640	148	.523	.108	
	不採用相等變異數			.624	81.310	.535	.108	
去油	採用相等變異數	1.080	.300	1.674	148	.096	.268	
	不採用相等變異數			1.767	98.343	.080	.268	
美白	採用相等變異數	.193	.661	-5.961	148	.000	939	
	不採用相等變異數			-5.512	72.639	.000	939	
保濕	採用相等變異數	.959	.329	-5.992	148	.000	852	
	不採用相等變異數			-5.658	75.877	.000	852	
去角質	採用相等變異數	.066	.797	-2.192	148	.030	353	
	不採用相等變異數			-2.081	76.766	.041	353	
緊緻毛孔	採用相等變異數	1.988	.161	-4.704	148	.000	756	
	不採用相等變異數			-4.325	71.810	.000	756	
卸股	採用相等變異數	.292	.590	-6.093	148	.000	-1.196	
	不採用相等變異數			-6.205	90.034	.000	-1.196	

※【注意】:上面的檢定表,【要經過2階段檢定】

步驟1:看【Levene檢定】的顯著性p值:

→判斷【顯著性是否<0.05】:

- →全部的【顯著性值】都>0.05
- →表示接受虛無假設【2個母體變異數相等的假設】
- →選擇第1列的值(平均值等式的顯著性p值)

【Levene檢定】顯著性p值>0.05, 選第1列t檢定值 【Levene檢定】顯著性p值<0.05, 選第2列t檢定值

步驟2:看【平均值等式的t檢定】的顯著性p值:

※注意1:本題是【雙**尾檢定**】

※判斷方法:【顯著性p是否<0.05】:

4-1.判斷【男女對於洗面乳選購抗痘的在意分數】, 是否【男女 有差異】?

一. 簡單判別:

因為p值<mark>???</mark>0.05, 所以<mark>???差異</mark>

二. 詳細判別:

真命題:男女對於洗面乳選購抗痘在意分數,男女有差異?

2個假設:

H0虛無假設(否定命題):男女對於洗面乳選購抗痘在意分數

,<mark>???</mark>差異

H1對立假設(肯定命題): 男女對於洗面乳選購抗痘在意分數

,<mark>???</mark>差異

檢定結果:

P值=<mark>???</mark>0.05,

所以, (符合)無法拒絕H0假設,

所以, 男女對於洗面乳選購抗痘在意分數, 男女<mark>???</mark>明顯差 異

但是, 因為抗痘分數平均值, 男生4.02, 女生3.91, 分數頗高

結論: 男女對於洗面乳選購抗痘在意分數, 男女**???**明顯差

異,男女都很在意洗面乳是否有【抗痘】功能

4-2.判斷【男女對於洗面乳選購去油的在意分數】, 是否【男女 有差異】?

	1		$\overline{}$	獨立	2.樣本檢定			
		變異數等式的	Levene 檢定				平均	J值等式的 t 檢定
		F	顯著性	t	自由度	顯著性 (尾)	雙	平均值差異
抗痘	採用相等變異數	.062	.803	.640	148		.523	.108
	不採用相等變異數			.624	81.310		.535	.108
去油	採用相等變異數	1.080	.300	1.674	148		.096	.268
	不採用相等變異數			1.767	98.343		.080	.268

一. 簡單判別:

因為p值<mark>???</mark>,所以<mark>???</mark>

二. 詳細判別:

真命題:男女對於洗面乳選購去油在意分數,男女有差異?

2個假設:

HO虚無假設(否定命題):男女對於洗面乳選購去油在意分數

,<mark>沒有差異</mark>

H1對立假設(肯定命題):男女對於洗面乳選購去油在意分數

,<mark>有差異</mark>

檢定結果:

P值=0.096>0.05.

所以. 無法拒絕H0假設.

所以, 男女對於洗面乳選購去油在意分數, 沒有差異 但是p值0.096接近0.05, 所以接近稍微有差異(在邊緣)

結論: 男女對於洗面乳選購去油在意分數, 沒有差異, 但在邊緣

單尾男生稍微高,但雙尾整體沒有差異

4-3.判斷【男女對於洗面乳選購美白...的在意分數】, 是否男 女有差異?

	1		$\overline{}$	獨立	江樣本檢定		
		變異數等式的 Levene 檢定				平比	的值等式的 t 檢定
		F	顯著性	t	自由度	顯著性(雙 尾)	平均值差異
抗痘	採用相等變異數	.062	.803	.640	148	.523	.108
	不採用相等變異數			.624	81.310	.535	.108
去油	採用相等變異數	1.080	.300	1.674	148	.096	.268
	不採用相等變異數			1.767	98.343	.080	.268
美白	採用相等變異數	.193	.661	-5.961	148	.000	939
	不採用相等變異數			-5.512	72.639	.000	939

一. 簡單判別:

因為p值<mark>???</mark>,所以<mark>???</mark>

二. 詳細判別:

<u>真命題:男女對於洗面乳選購美白在意分數, 男女有差異</u>?

2個假設:

HO虚無假設(否定命題):男女對於洗面乳選購美白在意分數

,<mark>沒有差異</mark>

H1對立假設(肯定命題):男女對於洗面乳選購美白在意分數

,<mark>有差異</mark>

檢定結果:

P值=0.00=0.0<0.05,

所以,<mark>拒絕</mark>H0假設,

所以, 男女對於洗面乳選購美白**在意分數**, <mark>有差異</mark>

4-4.判斷【男女對於洗面乳選購保濕, 去角質, 緊緻毛孔, 卸妝...的在意分數】, 是否男女有差異?

	1		$\overline{}$	獨立	立樣本檢定		$\overline{}$	
		變異數等式的	Levene 檢定			平均	平均值等式的t檢定	
		F	顯著性	t	自由度	顯著性(雙 尾)	平均值差異	
抗痘	採用相等變異數	.062	.803	.640	148	.523	.108	
	不採用相等變異數			.624	81.310	.535	.108	
去油	採用相等變異數	1.080	.300	1.674	148	.096	.268	
	不採用相等變異數			1.767	98.343	.080	.268	
美白	採用相等變異數	.193	.661	-5.961	148	.000	939	
	不採用相等變異數			-5.512	72.639	.000	939	
保濕	採用相等變異數	.959	.329	-5.992	148	.000	852	
	不採用相等變異數			-5.658	75.877	.000	852	
去角質	採用相等變異數	.066	.797	-2.192	148	.030	353	
	不採用相等變異數			-2.081	76.766	.041	353	
緊緻毛孔	採用相等變異數	1.988	.161	-4.704	148	.000	756	
	不採用相等變異數			-4.325	71.810	.000	756	
卸妝	採用相等變異數	.292	.590	-6.093	148	.000	-1.196	
	不採用相等變異數			-6.205	90.034	.000	-1.196	

一. 簡單判別:

因為p值<mark>???</mark>0.05, 所以<mark>???差異</mark>

二. 詳細判別:

<u>真命題:男女對於洗面乳選購保濕,去角質,緊緻毛孔,卸妝</u>...在意分數,男女有差異?

2個假設:

H0虚無假設(否定命題):男女對於洗面乳選購保濕,去角質, 緊緻毛孔,卸妝...在意分數,沒有差異

H1對立假設(肯定命題): 男女對於洗面乳選購保濕. 去角質.

緊緻毛孔, 卸妝...在意分數, 有差異

檢定結果:

P值=0.00=0.0<0.05,

所以, 拒絕H0假設,

所以, 男女對於洗面乳選購美白, 保濕, 去角質, 緊緻毛孔, 卸 妝…在意分數, 有差異