

Додаток 14

Правила, яких слід дотримуватися батькам або особам, які їх заміняють

Кожного ранку перед приходом до школи виконувати замір температури і перевіряти наявність респіраторних симптомів:

» Наявність температури вище 36,6 чи поява респіраторних симптомів.

» Наявність зв'язку з груповим спалахом захворювання на території країни або наявність недавнього візиту закордон.

Якщо дитина знаходиться на домашній ізоляції, батьки повинні навчити її дотримуватися таких профілактичних заходів:

- Залишатися вдома.
- Жити окремо в ізольованому просторі, якщо це можливо.
- Часто провітрювати приміщення.
- Приймайть їжу наодинці.

Якщо учень знаходиться на домашній ізоляції, батькам необхідно дотримуватися таких профілактичних заходів:

» Під час перебування на ізоляції щодня ретельно перевіряти стан здоров'я на наявність високої температури чи респіраторних симптомів.

» Під час періоду ізоляції члени сім'ї або співмешканці повинні максимально уникати контакту з хворим учнем:

- забороняється контактувати з літніми людьми, вагітними, малими дітьми, людям з хронічними захворюваннями або онкологією.

- забороняється прийом гостей.

» Жити в окремому приміщенні з дитиною на ізоляції і часто провітрювати його кімнату.

» Використовувати різні особисті предмети (рушники, посуд тощо) при користуванні спільним туалетом або душовою кабіною, дезінфікувати їх (наприклад, домашнім розчином хлорної рідини).

Додаток 15

Правила, яких слід дотримуватися учням/вихованцям та і батькам

Дотримуватися правил особистої гігієни

Ретельно мити руки з милом або обробляти їх антисептиком:

- перед вживанням їжі;
- після кожного відвідування вбиральні;
- після повернення з вулиці.

Дотримуватися етикету кашлю:

- необхідно прикрити обличчя рукавом одягу або одноразовою паперовою серветкою;
- після використання серветки необхідно викинути її у смітник;
- ретельно вимити руки з милом протягом 30 секунд.

У яких випадках необхідно повідомити класного керівника і не відвідувати заняття?

Наявність температури вище 36,6 або поява респіраторних симптомів.

Наявність зв'язку з груповим спалахом захворювання на території країни або недавній візит за кордон

Якщо Ви припинили відвідувати заняття у закладі освіти, необхідно дотримуватися таких профілактичних заходів:

Залишатися вдома.

Жити самому в ізольованому просторі, якщо це можливо.

Часто провітрювати приміщення.

Приймати їжу наодинці.

Дії у разі виявлення в групі/класі дитини з ознаками хвороби



1 Вчитель/Вихователь дистанційно (телефонним зв'язком) інформує **чергового адміністратора та мед.працівника**



Мед. працівник забирає дитину до ізолятора та повідомляє **заступника з господарської частини** про приміщення, де необхідно здійснити дезінфекцію


Дітей групи/класу ізолюють (припиняється рух дітей по садку/школі)

У разі потреби мед. працівник викликає швидку медичну допомогу



2 Технічний працівник проводить дезінфекцію приміщень

Черговий адміністратор: інформує батьків та РУО про виявлення дитини з ознаками хвороби; обмежує вхід до приміщень, де перебувала дитина з ознаками хвороби




3 РУО інформує медичну установу, управління Держпродспоживслужби



4 Вчитель/вихователь проводить інструктаж з дітьми, які були в контакті з дитиною з ознаками хвороби

Діти з групи/класу, де виявлено дитину з ознаками хвороби, переходять на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних досліджень



5 Якщо тест **не підтверджує** COVID-19 - діти групи/класу повертаються на навчання.

Якщо тест підтверджує COVID-19, діти переходять на дистанційне навчання (2 тижні).