

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом з 01 по 07 серпня 2025 року.

Кукурудза –молочна, молочна-воскова стиглість. Соя – утворення бобів. Соняшник – цвітіння, кінець цвітіння. Картопля – в'янення бадилля. Яблуня – ріст та налив плодів.

Протягом звітного періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах кукурудзи злаковими блішками за середньої чисельності 5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 12 % рослин на 14 % обстежених площ, гусеницями стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності 1 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % рослин на 33 % обстежених площ, гусеницями бавовняної совки в середній чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 43 % рослин на 87 % обстежених площ. Пухирчастою сажкою в середньому уражено 1 % рослин (на качанах – 40, на стеблах – 54, на волоті – 6 %) на 17 % обстежених площ, септоріозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 3 % обстеженої площі, летючою сажкою в середньому уражено 1 % рослин (на качанах 20 %, на стебло 80 %) на 5 % обстежених площ (2268 га).

В посівах сої гусеницями бавовняної совки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 55 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 45 % обстежених площ, гусеницями акацієвої вогнівки в середній чисельності 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 12 % рослин на 46 % обстежених площ, бульбочковими довгоносіками в середній чисельності 2 екз. на 100 п.с. та люцерновим клопом в середній чисельності 4 екз. на 100 п.с. на 19 % обстежених площ, польовими клопами за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 36 % обстежених площ. Аскохітозом уражено 10 % рослин з розвитком хвороби 8 % на 10 % обстежених площ, септоріозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 81 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 9 % обстежених площ (306 га).

В посівах соняшнику гусеницями бавовняної совки в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 30 % рослин на 64 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 17 % рослин на 27 % обстежених площ, гусеницями лучного метелика в середній чисельності 6 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 16 % рослин на 4 % обстежених площ, гусеницями соняшnikової вогнівки за середньої чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 5 % рослин на 21 % обстежених площ, геліхризовою попелицею в середній чисельності 8 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 10 % рослин на 16 % обстеженої площі, павутинним кліщем в середній чисельності 7 екз. на лист пошкоджено 5 % рослин на 1 % обстежених площ, польовими клопами за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому

пошкоджено 4 % рослин на 4 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 20 % обстежених площ, септоріозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 5 % обстежених площ, фомозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 30 % обстежених площ, іржею уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 1 % обстежених площ, білою гниллю уражено 1 % рослин (прикоренева форма - 78 %, стеблова форма - 10 %, кошик – 12 %) з розвитком хвороби 1 % на 15 % обстежених площ, сірою гниллю уражено 10 % рослин (прикоренева форма - 45 %, стеблова форма - 55 %) на 3 % обстежених площ (4279 га).

На присадибних ділянках у середній капусті гусеницями капустяної совки в середній чисельності 1,1 екз. на заселену рослину пошкоджено 4 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 3 екз. на заселену рослину пошкоджено 25 % рослин.

На присадибних ділянках у пізньої капусті капустяною попелицею в середній чисельності 12 екз. на заселену рослину пошкоджено 15 % рослин, гусеницями капустяного білану в середній чисельності 3 екз. на заселену рослину пошкоджено 2 % рослин, білокрилками в середній чисельності 9 екз. на заселену рослину пошкоджено 5 % рослин.

Імаго колорадського жука в середній чисельності 1 шт. на кущ картоплі в середньому заселено 5 % кущів, личинками в середній чисельності 3 шт. на кущ в середньому заселено 6 % кущів. Фітофторозом уражено 16 % кущів картоплі з розвитком хвороби 8 % (присадибні ділянки).

Личинками колорадського жука в середній чисельності 2 шт. на рослину томатів в середньому заселено 5 % рослин. Фітофторозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 5 % (присадибні ділянки).

З метою моніторингу фітосанітарного стану на виявлення саранових щоденно проводяться обстеження: в посівах кукурудзи нараховуються коники за середньої чисельності – 0,5 екз. на кв.м за на 1 % від обстежених площ 6302 га. На неорних землях середня чисельність саранових (коники, кобилки) – 1,4, максимально – 15 екз. на кв.м на 45 % від обстежених площ 341 га. На обстежених площах соняшнику (4863 га), сої (399 га), сорго (1 га), багаторічних насаджень (11 га) саранових не виявлено.