

На виконання наказу Держпродспоживслужби від 17 червня 2016 року № 159 «Про забезпечення виконання основних напрямків державної інформаційної політики у сфері захисту рослин, надання інформації щодо діяльності управлінь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в областях» Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом на 21 липня 2022 року.

В посівах кукурудзи (1084 га) злаковими блішками в середній чисельності – 6, максимально – 15 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 8, максимально – 22 % рослин в слабкому ступені на 77 % від обстеженої площі.

Злаковими попелицями в середній чисельності – 14, максимально – 30 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено – 8, максимально – 22 % рослин в слабкому ступені на 73 % від обстеженої площі кукурудзи 1084 га.

Яйцекладками стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності 1 кладка на рослину в середньому заселено 3 % рослин кукурудзи на 36 % від обстеженої площі 1084 га. Гусеницями шкідника в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 1 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 20 % обстежених площ.

Гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 37 % від обстеженої площі 1084 га.

Під час цвітіння на початку відкладання яєць стебловим (кукурудзяним) метеликом, совками випускають трихограму (100-150 тис. особин на га), а в період масового відкладання (через 7-8 днів) випуск трихограми повторюють. Хімічні обробки проти стеблового кукурудзяного метелика будуть ефективні й проти попелиць.

В Благовіщенському (Голованівському) районі пухирчастою сажкою уражено 1 % рослин (качани) на 171 га кукурудзи.

При перших симптомах і профілактично від гельмінтоспоріозу та іржі посіви кукурудзи обприскують дозволеними до використання фунгіцидами.

Польовими клопами в середній чисельності – 3, максимально – 7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 4, максимально – 5 % рослин сої на 89 % від обстеженої площі 190 га.

Бульбочковими довгоносіками в середній чисельності – 1,1, максимально – 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 4, максимально – 5 % рослин сої на 63 % від обстеженої площі 190 га.

В Гайворонському (Голованівський) районі гусеницями совки-гамми в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин сої (70 га).

Септоріозом уражено 4 % рослин сої з розвитком хвороби 2 % на 37 % обстежених площ 190 га. Аскохітозом уражено 6 % рослин сої з розвитком хвороби 4 % на 37 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 3 % рослин сої з розвитком хвороби 1 % на 26 % обстежених площ.

При виявленні перших ознак хвороб за бутонізації-цвітіння на насіннєвих посівах сої рекомендується проводити обробку рослин розчинами дозволених фунгіцидів. Рослини, уражені вірусними хворобами, з посівів видаляють. Під час формування бобів, за надпорогової чисельності шкідників проводять обприскування посівів інсектицидами, згідно з Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, підготовленого за даними Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні в 2022 році, (далі – Перелік). У період відкладання яєць совками, акаціевою вогнівкою випускають трихограму.

В посівах соняшнику буряковою попелицею в середній чисельності – 12, максимально – 13 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено – 8, максимально – 11 % рослин соняшнику в слабкому ступені на 22 % площ від обстежених 862 га. Геліхризовою попелицею в середній чисельності – 7, максимально – 15 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено – 2, максимально – 4 % рослин соняшнику в слабкому ступені на 30 % обстежених площ.

Гусеницями совки-гамми в середній чисельності – 0,8, максимально – 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 3, максимально – 5 % рослин соняшнику на 25 % обстежених площ 862 га. Гусеницями бавовникової совки в середній чисельності – 1, максимально – 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 2, максимально – 3 % рослин соняшнику на 18 % обстежених площ.

Польовими клопами в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин соняшнику на 11 % обстежених площ.

Пероноспорозом в середньому уражено – 3, максимально – 5 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 2, максимально – 3 % на 23 % з 862 га обстежених. Фомозом в середньому уражено – 8, максимально – 10 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 5, максимально – 6 % на 38 % обстежених площ. Септоріозом в середньому уражено – 13, максимально – 15 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 8, максимально – 10 % на 23 % обстежених площ.

В Петрівському (Олександрійському) районі соняшниковим вовчком уражено 2 % рослин соняшнику (79 га) за середній чисельності 1 екз. на заселену рослину.

Вогнища фітофагів локалізують дозволеними препаратами. Під час масового відкладання яєць совками, лучним метеликом доцільний випуск трихограми. За умов очікування епіфітотії гнилей кошиків, фомопсису, несправжньої борошнистої роси захищають рослини культури дозволеними до використання фунгіцидами. Першу обробку проводять на початку цвітіння, другу – через 14 днів після першої.

Імаго колорадського жука за середньої чисельності – 1,1, максимально – 2 екз. на кущ в середньому заселено і пошкоджено 3 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 2 % кущів, личинками в середній чисельності – 1,5, максимально – 3 екз. на кущ

в середньому заселено і пошкоджено 4 % кущів картоплі, в т.ч. в слабкому ступені – 67 %, середньому – 28 %, сильному – 5 % (присадибні ділянки).

Фітофторозом в середньому уражено – 12, максимально – 13 % рослин картоплі (присадибні ділянки) з середнім розвитком хвороби – 10, максимально – 11 %.

Фітофторозом в середньому уражено – 17, максимально – 25 % рослин томатів (присадибні ділянки) з середнім розвитком хвороби – 6, максимально – 15 %.

Пероноспорозом в середньому уражено – 30, максимально – 45 % рослин огірків (присадибні ділянки) з середнім розвитком хвороби – 5, максимально – 10 %.

Капустяною попелицею в середній чисельності – 32, максимально – 90 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 39, максимально – 45 % рослин середньої капусти (присадибні ділянки) в т.ч. в слабкому ступені – 50 %, сильному – 50 %, капустяною білокрилкою в середній чисельності – 27, максимально – 70 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 90, максимально – 100 % рослин середньої капусти, в т.ч. в слабкому ступені – 50 %, сильному – 50 % (присадибні ділянки), хрестоцвітими блішками в середній чисельності – 4, максимально – 7 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 23, максимально – 25 % рослин середньої капусти в слабкому ступені (присадибні ділянки), гусеницями капустяної совки в середній чисельності – 1,1, максимально – 2 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 3 % рослин середньої капусти в слабкому ступені (присадибні ділянки).

Капустяною попелицею в середній чисельності – 50, максимально – 90 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 45 % рослин пізньої капусти в сильному ступені (присадибні ділянки), капустяною білокрилкою в середній чисельності – 40, максимально – 70 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 100 % рослин пізньої капусти в сильному ступені (присадибні ділянки).

Баштанною попелицею в середній чисельності – 18, максимально – 28 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 6 % рослин дині (5 га) в слабкому ступені.

Проти листогризух та сисних комах, хвороб слід застосовувати рекомендовані за регламентами технологій препарати. Наступні обробки посівів проводять через 8-10 днів за суворого дотримання „строків очікування” до збирання врожаю.

Гусеницями яблуневої плодожерки пошкоджено 30 % плодів на 50 % дерев (4 га саду та присадибні ділянки). В Бобринецькому (Кропивницькому) районі з 15 липня відмічено літ метеликів яблуневої плодожерки II покоління.

Паршею яблуні в середньому уражено – 9, максимально – 15 % листків з середнім розвитком хвороби – 5, максимально – 8 %, в середньому 5 % плодів з

середнім розвитком хвороби 3 % в середньому на – 30, максимально – 40 % дерев (4 га саду та присадибні ділянки).

Плодовою гниллю в середньому уражено – 5, максимально – 7 % плодів падалиці під 30 % дерев (4 га).

Плодові насадження за поширення шкідників і хвороб захищають дозволеними препаратами відповідно до розроблених рекомендацій.