

Reglamentos de Enfermedad

FIEBRE: Un estudiante con fiebre de 100.0F o más no debe asistir a la escuela. Si un estudiante llega a la escuela con fiebre de 100.0F o más, el estudiante será enviado a casa. Si no se puede contactar a nadie para recoger al estudiante y la fiebre está aumentando, se puede llamar al 911 para transportar al estudiante para recibir tratamiento médico. Esto dependerá de la evaluación por parte de la enfermera del centro en función de los síntomas clínicos del alumno. Un estudiante DEBE estar libre de fiebre durante al menos 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, como Tylenol o Motrin) antes de regresar a la escuela.

DOLOR DE CABEZA: Los dolores de cabeza pueden ser causados por muchas cosas, como fiebre, estrés, senos paranasales, enfermedades virales y deshidratación. Algunos dolores de cabeza pueden ser graves, mientras que otros son leves. Cuando un estudiante tiene un dolor de cabeza que se asocia con fiebre y/o dolor/rigidez de cuello o un dolor de cabeza que dura más de un par de horas, el estudiante debe ser visto por un proveedor de atención médica. Un dolor de cabeza leve puede interferir con la capacidad de aprendizaje de un estudiante. Cuando un estudiante tiene dolor de cabeza durante el horario escolar y el dolor de cabeza no desaparece después de 20-30 minutos, el estudiante puede ser enviado a casa.

DOLOR DE GARGANTA: El dolor de garganta es muy común. Pueden ser causadas por drenaje de los senos paranasales, respiración bucal, virus (resfriados), bacterias (estreptococos), deshidratación y cualquier cosa que pueda irritar los tejidos (como alimentos, líquidos calientes, etcétera...). Cuando un estudiante tiene fiebre con dolor de garganta, el estudiante debe consultar a un proveedor de atención médica antes de regresar a la escuela. Un estudiante que tenga dolor de garganta con fiebre de 100 grados o más será enviado a casa. Un estudiante con dolor de garganta sin fiebre puede calmarse bebiendo líquidos fríos (no calientes) e identificando y tratando la causa subyacente (resfriados, drenaje de los senos paranasales, etcétera).

VÓMITOS: Cuando un estudiante ha estado vomitando, el estudiante no debe venir a la escuela hasta que haya comido alimentos sólidos durante al menos 2 comidas sin vomitar. Un estudiante que vomite más de una vez, mientras está en la escuela, puede ser enviado a casa. Los vómitos pueden provocar deshidratación muy rápidamente, especialmente en los niños más pequeños. Cuando un estudiante ha estado vomitando durante más de 12 a 24

horas, debe consultar a su proveedor de atención médica lo antes posible.

DIARREA: Cuatro o más heces blandas/líquidas en menos de 12 horas se consideran diarrea. Ciertas formas de diarrea pueden ser contagiosas. Cuando un estudiante tiene 4 o más heces blandas durante la escuela y/o asociadas con dolor abdominal, dolor de cabeza, fiebre, vómitos o flatos malolientes, el estudiante debe consultar a un profesional de la salud. Recuerde que la diarrea puede causar deshidratación rápidamente, especialmente en los niños más pequeños. Cuando un estudiante tiene múltiples episodios de diarrea que duran más de 12 a 24 horas, el estudiante debe consultar a un proveedor de atención médica lo antes posible.

DOLOR ABDOMINAL: Cualquier forma de dolor abdominal en un niño debe tomarse en serio. Muchas cosas causan dolor abdominal, como estreñimiento, enfermedades virales, intolerancias alimentarias, infección en la garganta, problemas/infecciones urinarias, problemas digestivos y problemas relacionados con las mujeres. Un estudiante que se queja de dolor abdominal no debe ir a la escuela hasta que el problema haya sido identificado, preferiblemente por un proveedor de atención médica. Cualquier estudiante con dolor abdominal que dure más de 15-30 minutos puede ser enviado a casa.

TOS: Una tos crónica puede propagar gérmenes y ser disruptivo en un salón de clases. Por favor, tenga esto en cuenta cuando decida enviar a un estudiante a la escuela. Un estudiante con tos puede ser evaluado por la enfermera de la escuela. Un estudiante con tos excesiva puede ser enviado a casa. Si un estudiante trae pastillas para la tos o medicamentos para la tos a la escuela, el estudiante debe tener un Formulario de Autorización del Prescriptor/Padre (PPA) completado y firmado por un médico y un padre.

Conjuntivitis/Infección de Ojos: La conjuntivitis o la conjuntivitis bacteriana/viral pueden propagarse fácilmente. Un estudiante con ojos hinchados y con picazón roja/rosa; secreción ocular; posible sensibilidad a la luz; y/o dolor ocular puede ser enviado a casa. Si estos síntomas continúan, el estudiante debe ser examinado por un proveedor de atención médica. Se recomienda el lavado de manos meticuloso y el saneamiento de las áreas de alto "contacto".

SARPULLIDO(ronchas): Hay todo tipo de sarpullido. Algunos no son más que piel irritada, mientras que otros son muy contagiosos. Los reglamentos incluyen:

- Todas las ronchas DEBEN estar cubiertas por ropa o un vendaje.
- Un estudiante con una roncha no diagnosticada que dura más de 2 días puede requerir tener una nota del médico para regresar a la escuela.
- Un estudiante con una roncha en el cuero cabelludo puede necesitar una nota del médico para poder regresar a la escuela.
- Un estudiante con una roncha asociada con fiebre y/o tos debe ser evaluado por un médico.
- Un estudiante con ronchas en el estómago, la espalda, los brazos o las piernas debe ser evaluado por un médico.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Las enfermeras de la Escuela del Condado de Morgan no reemplazan a un médico. Ninguna de la información proporcionada está destinada a reemplazar a un médico. Cada estudiante debe tener su propio proveedor de atención médica. La información está destinada únicamente a fines informativos. Las Escuelas del Condado de Morgan, su personal, maestros y enfermeras no son responsables de nadie que no siga los consejos de su propio médico o proveedor de atención médica.