

На виконання наказу Держпродспоживслужби від 17 червня 2016 року № 159 «Про забезпечення виконання основних напрямків державної інформаційної політики у сфері захисту рослин, надання інформації щодо діяльності управлінь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в областях» Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом на 24 серпня 2023 року.

Гусеницями стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності 1,3 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 4 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 21 % обстежених площ (4636 га).

Гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 1,1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено - 5, максимально - 10 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 75 % від обстеженої площі 4636 га.

Пухирчастою сажкою уражено - 2, максимально 4 % рослин (на качанах 58 %, на стеблі 42%) на 555 га кукурудзи з 4636 га обстежених площ.

В Олександрійському (Петрівський район) та Кропивницькому (Бобринецький район) районах летючою сажкою уражено - 1, максимально 2 % рослин (на волоті 100 %) на 143 га кукурудзи з 499 га обстежених площ.

В Кропивницькому районі (Кропивницький район) фузаріозною гниллю уражено - 37, максимально 70 % качанів на 2452 га кукурудзи.

Павутинним кліщем в середній чисельності - 3, максимально - 12 екз. на листок пошкоджено - 5, максимально - 10 % рослин сої в слабкому ступені на 45 га обстежених площ.

Попелицями в середній чисельності – 3, максимально - 5 екз. на рослину в середньому пошкоджено 3 % рослин сої в слабкому ступені на 40 га обстеженої площі.

Септоріозом уражено 3 % рослин сої з розвитком хвороби 3 % на 89 % обстежених площ 45 га.

В Кропивницькому районі (Олександрівський район) аскохітозом уражено 2 % рослин сої з розвитком хвороби 2 % на 40 га обстежених площ.

Під час формування бобів, за надпорогової чисельності шкідників проводять обприскування посівів інсектицидами, згідно з Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, підготовленого за даними Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні в 2023 році (далі – Перелік).

Гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 5, максимально – 7 % рослин соняшнику на 39 % обстежених площ (1665 га).

В Кропивницькому (Бобринецький район) та Олександрійському (Петрівський район) районах гусеницями соняшникової вогнівки в середній чисельності - 1,2, максимально – 4 екз. на кошик заселено і пошкоджено – 2, максимально - 8 % рослин соняшнику (460 га).

Пероноспорозом в середньому уражено 2 % рослин соняшнику з середнім

розвитком хвороби 2 % на 12 % з 1665 га обстежених.

Фомозом в середньому уражено – 8, максимально – 17 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 5, максимально – 14 % на 31 % обстежених площ (1665 га).

В Кропивницькому районі (Новгородківський район) іржею в середньому уражено 5 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби 3 % на 250 га обстежених площ.

Сірою гниллю уражено – 3, максимально - 6 % рослин соняшнику (330 га) в прикореневій формі – 34 %, стебловій формі – 36 %, кошиковій формі – 30 % з розвитком хвороби на кошиках 2 %.

Білою гниллю уражено – 2, максимально – 4 % рослин соняшнику (308 га) в прикореневій формі – 75 %, стебловій формі – 12 %, кошиковій формі – 13 % з розвитком хвороби на кошиках 1 %.

Фітофторозом в середньому уражено 70 % рослин картоплі (присадибні ділянки) з середнім розвитком хвороби 30 %.

Фітофторозом в середньому уражено – 32, максимально - 40 % рослин томатів (присадибні ділянки) з середнім розвитком хвороби – 22 %, максимально – 35 %.

В Бобринецькому (Кропивницький) районі капустяною попелицею в середній чисельності – 16, максимально – 28 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено – 34, максимально - 60 % рослин пізньої капусти в слабкому ступені 98 %, середньому – 2 % (присадибні ділянки); гусеницями капустяної совки в середній чисельності – 1,1, максимально - 2 екз. на рослину заселено і пошкоджено 5 % рослин пізньої капусти (присадибні ділянки) в слабкому ступені – 99 %, середньому - 1 %, хрестоцвітими блішками в середній чисельності – 4, максимально 8 екз. на рослину заселено і пошкоджено – 45 %, максимально - 50 % рослин пізньої капусти (присадибні ділянки) в слабкому ступені – 99 %, середньому - 1 %.

Пізні сорти капусти за потреби захищають дозволеними до використання інсектицидами, суворо дотримуючись санітарних вимог щодо збирання врожаю.

В Бобринецькому (Кропивницький) районі гусеницями яблуневої плодожерки пошкоджено – 6, максимально - 7 % плодів на 30 % дерев (4 га саду). Паршею яблуні в середньому уражено 10, максимально - 12 % листків з середнім розвитком хвороби – 8 %, максимально 9 % на 30 % дерев, плодовою гниллю в середньому уражено – 16, максимально - 18 % плодів падалиці під 60 % дерев (4 га).

Плодові насадження за поширення шкідників і хвороб захищають дозволеними препаратами відповідно до розроблених рекомендацій.