BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
KHOA DƯỢC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2023

THÔNG TIN THUỐC

V/v: Hướng dẫn sử dụng **Nifedipin**

I. Chỉ định:

- Tăng huyết áp
- Đau thắt ngực ổn định
- Đau thắt ngực Prinzmetal

II. Liều dùng:

Tăng huyết áp: Liều khởi đầu 1 viên 20 mg, 30 mg hoặc 60 mg/lần/ngày. Tăng liều tuỳ theo đáp ứng của bệnh nhân, tối đa 90 mg/lần/ngày hoặc 40 mg/lần x 2 lần/ngày.

III. Cách dùng:

Uống nguyên viên, không nhai, bẻ, nghiền

IV. Phụ nữ mang thai và cho con bú:

- Phụ nữ mang thai: Dữ liệu trên người gợi ý nguy cơ thấp
- Phụ nữ cho con bú: Dữ liệu trên người hạn chế - Có thể tương thích

V. Tên một số sản phẩm sử dụng tại Bệnh viện Hùng Vương:

- Nifedipin Hasan 20 Retard 20mg
- Stadovas 5 mg

Tài liệu tham khảo:

1) *Dược thư Quốc Gia Việt Nam 2022*
2) *Drugs in Pregnancy and Lactation*

Tổ TTT-Dược lâm sàng **Khoa Dược**

Ds. Nguyễn Thanh Hoài Phong **Ds. Đoàn Thị Ngọc Hân**