


يوم: 30/11/2010 م
الموافق لـ: 24 ذي الحجة 1431 هـ .

المؤسسة: ثانوية هواري بومدين
(اليشير) - ولاية برج بوعريريج - .

اختبار الثلاثي الأول في الرياضيات

المدة: ساعتان.

المستوى و الشعبة: الثانية ثانوي " هندسة مدنية " .



التمرين الأول: (06 ن)

f الدالة المعرفة على المجموعة $\mathbb{R}$ كما يلي:
 $f(x) = x^2 - x - 6$ و (C) تمثيلها البياني في
معلم . (انظر الشكل المقابل)

1. عين ؛ بيانيا ؛ S_1 مجموعة حلول المتراجحة

الآتية ذات المجهول الحقيقي x :

$$x^2 - x - 6 \geq 0 .$$

2. احسب $f'(x)$ حيث f' هي الدالة المشتقة
للدالة f .

3. اكتب معادلة للمماس (Δ) للمنحنى (C) عند
النقطة ذات الفاصلة x_0 حيث $x_0 = 0$.

4. أعد رسم المنحنى (C) و المماس (Δ) في
نفس المعلم .

التمرين الثاني: (05 ن)

• $P(x)$ كثير الحدود للمتغير الحقيقي x حيث: $P(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$.

1. تحقق أن العدد (-1) جذر لكثير الحدود $P(x)$.

2. عين الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي x :

$$P(x) = (x + 1)(ax^2 + bx + c) .$$

3. عين جذور كثر الحدود $P(x)$ و استنتج إشارة $P(x)$ على $\mathbb{R}$. (استعن بجدول)

التمرين الثالث: (05 ن)

1. مثل في معلم متعامد و متجانس $(O; I; J)$ النقط : $A(2; 1)$ ، $B(-1; 5)$ ، $C(5; 7)$ و $D(1; \frac{5}{2})$.

2. عين إحداثيتي النقطة H مركز المسافتين المتناسبتين للنقطتين B ، C .

3. عين إحداثيتي النقطة G مركز ثقل المثلث ABC .

4. هل يوجد عدد حقيقي x بحيث تكون النقطة D مرجح الجملة: $(A, 1)$ ، (B, x) ؟ علل .

التمرين الرابع: (04 ن)

• الدالتان المعرفتان على المجموعة كما يلي: $f(x) = 2x^2 - 1$ ، $g(x) = 4x^3 - 3x$

- عين $(g \circ f)(x)$ ، $(f \circ g)(x)$ من أجل كل عدد حقيقي x . ماذا تستنتج ؟

انتهى

الصفحة 1 من 1

بالتوفيق