

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період 24-30 березня 2023 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь – відновлення вегетації. Озимий ріпак – відновлення вегетації.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,7 % рослин на 14 % обстежених площ, личинками хлібної жужелиці за середньої чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 3 % обстежених площ, злаковими блішками за середньої чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 4 % обстежених площ. В теплі сонячні дні у посівах озимої пшениці спостерігався літ шведських мух – в середньому 5 екз. на 100 п.с. на 12 % від обстежених площ, злаковими цикадами в середній чисельності 7 екз. на 100 п.с. заселено 16 % обстежених площ. Борошнистою россою уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 18 % обстежених площ, бурю іржею уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 4 % обстежених площ, септоріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 47 % обстежених площ (2796 га).

В посівах озимого ячменю борошнистою россою уражено 1 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 40 % обстежених площ, бурю іржею уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 60 % обстежених площ (75 га).

В посівах озимого ріпаку гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 1 % обстежених площ, капустяним стебловим прихованохоботником за середньої чисельності 0,8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 22 % обстежених площ, ріпаківим листодом за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 7 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 16 % обстежених площ, альтернаріозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 15 % обстежених площ, фомозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 11 % обстежених площ, білою плямистістю уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 10 % обстежених площ (1090 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1,1, нр на колонію – 3 на 31 % обстеженої площі 2796 га. На площах озимого ячменю середня чисельність колоній шкідника – 1, нр на колонію – 3 на 60 % обстеженої площі 75 га. На площах озимого ріпаку середня чисельність колоній шкідника – 1,1, нр на колонію – 7 на 41 % обстеженої площі 1090 га. На неорних площах середня чисельність колоній шкідника – 1,3, нр на колонію – 5 на 100 % обстеженої площі 4 га.