BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
KHOA DƯỢC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2023

THÔNG TIN THUỐC

V/v: Hướng dẫn sử dụng **Methylprednisolon**

I. Chỉ định:

- Các trường hợp dị ứng nặng hoặc không đáp ứng với các biện pháp điều trị thông thường như các phản ứng quá mẫn của thuốc, các phản ứng tiêm truyền.
- Viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống, một số thể viêm mạch
- Viêm động mạch thái dương, viêm quanh động mạch nốt, bệnh sarcoid, hen phế quản, viêm loét đại tràng mạn, thiếu máu tan máu, giảm bạch cầu hạt, dị ứng nặng gồm cả phản vệ
- Bệnh leukemia cấp, u lympho, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt
- Hội chứng thận hư nguyên phát

II. Liều dùng:

- Uống: liều thông thường 2 – 60 mg/ngày tuỳ theo tình trạng bệnh
- Tiêm: cá thể hoá liều dùng, tuỷ thuộc vào tình trạng bệnh

III. Cách dùng:

- Uống: nên uống sau bữa ăn, với thức ăn hoặc sữa để giảm kích ứng đường tiêu hoá. Nếu kê đơn 1 lần/ngày, nên uống vào buổi sáng.
- Tiêm bắp (dạng acetat hoặc succinat)
- Tiêm, truyền tĩnh mạch (dạng muối succinat)

IV. Phụ nữ mang thai và cho con bú:

- Phụ nữ mang thai: Dùng kéo dài methylprednisolon toàn thân cho người mẹ có thể dẫn đến giảm nhẹ thể trọng của trẻ sơ sinh. Vì vậy, ***cân nhắc lợi ích và nguy cơ*** trước khi sử dụng thuốc.
- Phụ nữ cho con bú: Thuốc được bài tiết một lượng nhỏ vào sữa mẹ nên cần ***thận trọng*** trước khi sử dụng thuốc.

V. Tên một số sản phẩm sử dụng tại Bệnh viện Hùng Vương:

- Preforin inj. 40mg

- Depo-Medrol 40mg (chỉ tiêm bắp)

Tài liệu tham khảo:

1) *Dược thư Quốc Gia Việt Nam 2022*
2) *HDSD của nhà sản xuất*

Tổ TTT-Dược lâm sàng	**Khoa Dược**
Ds. Nguyễn Thanh Hoài Phong	**Ds. Đoàn Thị Ngọc Hân**