التمرين الأوّل: $3V+2R+1B=5$

1- إمكانيات السحب: (سحب كريتان على التوالي بالإرجاع)

	V_1	V_2	V_3	R_1	R_2	B
V_1	V_1V_1	V_1V_2	V_1V_3	V_1R_1	V_1R_2	V_1B
V_2	V_2V_1	V_2V_2	V_2V_3	V_2R_1	V_2R_2	V_2B
V_3	V_3V_1	V_3V_2	V_3V_3	V_3R_1	V_3R_2	V_3B
R_1	R_1V_1	R_1V_2	R_1V_3	R_1R_1	R_1R_2	R_1B
R_2	R_2V_1	R_2V_2	R_2V_3	R_2R_1	R_2R_2	R_2B
B	BV_1	BV_2	BV_3	BR_1	BR_2	BB

عدد إمكانيات السحب: 36

2- حساب احتمال الأحداث:

A : الكريتان من نفس اللون: $P(A)=\frac{14}{36}=\frac{7}{18}$

B : الكرية الأولى حمراء: $P(B)=\frac{12}{36}=\frac{1}{3}$

C : كرية خضراء على الأقل: $P(C)=\frac{27}{36}=\frac{3}{4}$

3- أ) قيم المتغير العشوائي:

$\boxtimes VV \to 6$ $\quad \boxtimes VR \to -1$ $\quad \boxtimes VB \to 4$

$\boxtimes RR \to -8$ $\quad \boxtimes RB \to -3$ $\quad \boxtimes BB \to 2$

$X \in \{-8;-3;-1;2;4;6\}$

ب) قانون احتمال X :

x_i	-8	-3	-1	2	4	6
$P(X=x_i)$	$\frac{4}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{9}{36}$

جـ) حساب الأمل الرياضياتي

$$E(X)=\sum_{i=1}^{6}x_i p_i$$


$$=(-8)\frac{4}{36}+(-3)\frac{4}{36}+(-1)\frac{12}{36}+(2)\frac{1}{36}+(4)\frac{6}{36}+(6)\frac{9}{36}$$

$$=\frac{-32-12-12+2+24+36}{36}=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$$

د) بما أن $E(X)>0$ فإنّ اللعبة في صالح اللاعب.

التمرين الثاني:

1- إنشاء النقاط:



2- إثبات أن H هي نقطة تلاقي المستقيمان (CI) و (AJ) :

✔ بما H مرجح الجملة $\{(A;1),(B;4),(C;-2)\}$

و I مرجح الجملة $\{(A;1),(B;4)\}$

فإن حسب خاصية التجميع:

H هي مرجح الجملة $\{(I;5),(C;-2)\}$

ومنه: $H\in(CI)$ .....(1)

✔ لدينا H مرجح الجملة $\{(A;1),(B;4),(C;-2)\}$

ولدينا J مرجح الجملة $\{(B;2),(C;-1)\}$

ومنه J مرجح الجملة $\{(B;4),(C;-2)\}$

فإن حسب خاصية التجميع:

H هي مرجح الجملة $\{(A;1),(J;2)\}$

ومنه: $H\in(AJ)$ .....(2)

من (1) و (2) نستنتج أن:

H هي نقطة تلاقي المستقيمان (CI) و (AJ)

3) مجموعة النقط: $\left\|\overrightarrow{MA}+4\overrightarrow{MB}\right\|=5\left\|2\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\right\|$

$5MI=5MJ$ ومنه $MI=MJ$

ومنه مجموعة النقط هي محور القطعة المستقيمة $[IJ]$.

4) مجموعة النقط: $2\left\|\overrightarrow{MA}+4\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}\right\|=\left\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MC}\right\|$

$6MH=AC$ ومنه $MH=\frac{AC}{6}$

ومنه مجموعة النقط هي الدائرة التي مركزها H ونصف قطرها $\frac{AC}{6}$.

الجزء الثاني: $A(1;1)$ ، $B(3;0)$ ، $C(1;-2)$

$\{(A;\alpha),(B;-3\alpha+3),(C;2\alpha)\}$ مرجح الجملة G_α

-1 $(\alpha)+(-3\alpha+3)+(2\alpha)=3\neq 0$

ومنه من أجل كل عدد حقيقي α فإنّ G_α موجودة.

-2 $G_\alpha\left(\frac{(\alpha)(1)+(-3\alpha+3)(3)+(2\alpha)(1)}{3};\frac{(\alpha)(1)+(-3\alpha+3)(0)+(2\alpha)(-2)}{3}\right)$

$G_\alpha\left(\frac{-6\alpha+9}{3};\frac{-3\alpha}{3}\right)$ ومنه $G_\alpha(-2\alpha+3;-\alpha)$

-3 تعيين قيمة α حتى تنتمي G_α إلى حامل محور التراتيب:

$x_{G_\alpha}=0$ يعني $-2\alpha+3=0$ أي $\alpha=\frac{3}{2}$