

TERMIN BADANIA: GODZ.....

**Centrum medyczne „SOPMED” Sp. z o.o.
Pracownia Endoskopii**

Przygotowanie do kolonoskopii

Szanowni Pacjenci, prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi prawidłowego przygotowania się do badania.

Kilka dni przed ustalonym terminem badania	1 dzień przed terminem badania	W dniu badania
nie należy spożywać, pokarmów zawierających drobne nasiona i pestki (siemię lniane, mak, arbuz, winogrona, pomidor, kiwi) oraz warzyw o intensywnym zabarwieniu (buraczki), ciemnego pieczywa.	lekkostrawne śniadanie, bez mleka, surowych owoców i warzyw oraz napojów gazowanych. Na obiad można spożyć zmięszana zupę, kisiel, budyn, serek homogenizowany bez dodatków. Pić można dowolną ilość wody niegazowanej lub lekkiej herbaty.	Do 2 godziny przed badaniem można pić dowolną ilość wody niegazowanej i lekkiej herbaty. <u>Jeżeli badanie będzie wykonywane w znieczuleniu, w dniu badania nie należy nic pić!</u>

FORTTRANS – zasady postępowania

1. środek przeczyszczający, należy zakupić w aptece 4 saszetki.
2. w dniu poprzedzającym badanie, należy rozpuścić osobno każdą saszetkę w litrze **NIEGAZOWANEJ** wody.
3. od godziny 9 rano, dnia poprzedzającego badanie, pić roztwór w tempie 1 szklanka co 20 minut (np. 1 litr roztworu wypić między godz. 9.00 – 12.00, drugi między godz. 12.00 - 15.00, trzeci między godz. 15.00 – 17.00, czwarty między godz. 17.00 – 20.00).
4. roztwór należy pić powoli, można popijać wodą niegazowaną lub słabą herbatą w ilości jaką pacjent jest w stanie przyjąć dodatkowo.
5. od chwili wypicia roztworu **NIE NALEŻY NIC JEŚĆ**.
6. normalną reakcją na lek jest wypróżnienie, pod koniec treścią płynną.
7. jeżeli nie będzie pełnego oczyszczenia jelita, należy rano wykonać lewatywę rano za pomocą gotowej lewatywy o nazwie ENEMA, która można zakupić w aptece.
8. w dniu badania nie można pić roztworu przeczyszczającego.
- 9.** w dniu badania nie wolno palić papierosów.

UWAGA !

1. osoby z chorobami wymagającymi regularnego przyjmowania leków na nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczkę, lub leków psychotropowych i innych, w dniu przeprowadzenia badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody (co najmniej 6 godzin przed badaniem).
2. w przypadku przyjmowania leku na obniżenie krzepliwości krwi acenokumarol, sintrom, ticlid lub aspiryna, acard, acesam i inne) należy w porozumieniu z lekarzem pierwszego kontaktu, przerwać ich stosowanie na 4 dni przed badaniem.
3. osoby, przyjmujące leki na cukrzyce, powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym w celu ustalenia procesu przygotowania do badania oraz poinformować o chorobie lekarza przeprowadzającego kolonoskopię oraz powinny kontrolować poziom cukru we krwi.
4. kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania.
5. jeżeli badanie będzie wykonywane w znieczuleniu, przez pozostałą część dnia obowiązuje **bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i maszyn mechanicznych oraz zakaz pica alkoholu**.

Pacjenci zobowiązani są w dniu przeprowadzenia badania do przedstawienia lekarzowi wyniki z poprzednich gastrokopii i kolonoskopii z zaleceniami lekarza leczącego – kierującego. W przypadku badania z znieczuleniem należy posiadać aktualne EKG serca.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z BADANIA PROSIMY O POWIADOMIENIE – TELEFON 58/ 555 – 26 - 30

