

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 06 по 12 жовтня 2023 року.

Озима пшениця – сходи. Озимий ріпак – 2-4 листка, утворення розетки.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимої пшениці відмічається літ цикадок в середньому нараховується 3 екз. на 100 п.с. на 38 % обстежених площ (330 га).

У посівах озимого ріпаку хрестоцвітими блішками в середній чисельності 1,8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 6 % рослин на 79 % обстеженої площі, несправжніми гусеницями ріпакового пильщика в середній чисельності 0,6 екз. на рослину в середньому пошкоджено 3 % рослин на 35 % обстежених площ, гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 15 % обстежених площ. Альтернативіозом уражено 3 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 1 % на 5 % обстежених площ (574 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1,6, нір на колонію 3 на 100 % обстеженої площі 330 га. На площах озимого ріпаку середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію – 3 на 3 % обстеженої площі 574 га. На площах з-під кукурудзи середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію 8 на 100 % обстеженої площі 125 га. На площах з-під соняшнику середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 2, нір на колонію 4 на 90 % обстеженої площі 540 га.