BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
KHOA DƯỢC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2023

THÔNG TIN THUỐC

V/v: Hướng dẫn sử dụng **Metoprolol**

I. Chỉ định và liều dùng:

Chỉ định	Liều dùng
Tăng huyết áp	50-100 mg/ngày, uống 1 lần hoặc chia thành nhiều liều nhỏ, có thể tăng liều lên đến 200 mg/ngày
Điều trị dài hạn chứng đau thắt ngực	100-200 mg/ngày
Điều trị một số rối loạn nhịp tim nhanh (nhịp nhanh trên thất, nhịp nhanh thất)	100-200 mg/ngày
Điều trị dự phòng sau nhồi máu cơ tim	200 mg/lần/ngày
Điều trị suy tim mạn tính ổn định mức độ trung bình đến nặng có giảm chức năng tâm thu thất trái phối hợp với thuốc ức chế men chuyển, lợi tiểu và trong đa số trường hợp với các digitalis trợ tim	- *Suy tim ổn định độ II*: liều khởi đầu khuyến cáo là 25 mg/lần/ngày, có thể tăng liều mỗi 2 tuần, tối đa 200 mg/ngày - *Suy tim ổn định độ III-IV*: liều khởi đầu khuyến cáo là 12,5 mg/lần/ngày, có thể tăng gấp đôi liều mỗi 2 tuần, tối đa 200 mg/ngày

II. Cách dùng:

Uống. Với dạng bào chế phóng thích kéo dài, uống liều duy nhất trong ngày, không được nhai, bẻ, nghiền.

III. Phụ nữ mang thai và cho con bú:

- Phụ nữ mang thai: Dữ liệu trên người gợi ý nguy cơ khi sử dụng ở 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kì
- Phụ nữ cho con bú: Dữ liệu trên người hạn chế - Có thể gây độc

IV. Tên một số sản phẩm sử dụng tại Bệnh viện Hùng Vương:

- Betaloc-Zok 25mg (viên phóng thích kéo dài)
- Egilok 25mg

Tài liệu tham khảo:

1) *Dược thư Quốc Gia Việt Nam 2022*
2) *Drugs in Pregnancy and Lactation*
3) *HDSD Betaloc-Zok 25mg*

Tổ TTT-Dược lâm sàng	**Khoa Dược**
Ds. Nguyễn Thanh Hoài Phong	**Ds. Đoàn Thị Ngọc Hân**