

Як розпізнати лісового кліща

Місце існування:

ліси, луки, парки та сквери – місця, де є кущі і трава

Активність:

тепла пора року з квітня по жовтень, пік активності кліща – червень-липень

Кров смокчуть лише самиці

Як виглядає:

павукоподібна комаха з гострим хоботком, має чотири пари кінцівок

Розмір:

від 3 мм до 25 мм в довжину в залежності від виду кліща

Особливості

Як відрізнити небезпечну самицю від самця

самиці більші за самців, їх спинний щиток займає третину тіла, решта частина поверхні забарвлена у темно - червоний колір

тіло у голодній самиці плоске, а у самиці, що напилась крові набуває яйцевидної форми

можуть висмоктувати значні порції крові та збільшувати власну вагу в 100 разів

хоча очі у комахи відсутні, вона може відрізнити світло від темряви
дякуючи вмінню відрізнити запахи та відчувати тепло, кліщ швидко знаходить жертву

Вага голодній самиці складає 3-4 мг, а нагодованої від 40 до 500 мг, в середньому 160 – 350 мг

Самиця кліща п'є кров лише один раз за сезон

Зустрічаються випадки, коли самці теж смокчуть кров, але вони неспроможні робити це протягом довгого часу, як це роблять самиці

Як кліщ нападає на людину

Кліщ непомітно кусає жертву, виділяючи анестезуючу речовину, яка міститься у його слині та робить момент присмоктування безболісним. Людина довгий час не відчуває комахи. За деякий час після укусу голова самиці кліща вже повністю занурюється під шкіру людини, а її тіло роздувається від випитої крові.