
Практическое занятие №8
Обучение переноске пострадавшего на руках. Выполнение транспортировки пострадавшего и его размещение в МТС.

Транспортное положение - это положение, которое нужно придать пострадавшему на время ожидания вызванной бригады скорой медицинской помощи.

Транспортное положение зависит от характера повреждения и тяжести состояния пострадавшего. Правильный выбор этого положения облегчает страдания и улучшает состояние человека, получившего травму.

I. Основные транспортные положения при травмах

1. Черепно-мозговая травма




• Возвышенное положение.
• Голову не запрокидывать (среднее положение)!

Цель:
Улучшение оттока венозной крови от головного мозга, снижение внутричерепного давления, предупреждение отека головного мозга.

2. Травма позвоночника
• По возможности сохранить то положение, в каком обнаружен пострадавший.
• Фиксировать шею импровизированным воротником.
• Перекладывать с 4 - 5 помощниками.
• Уложить на ровную поверхность.

Цель:
Иммобилизация, предотвращение дальнейших повреждений



3. Травма груди



• Возвышенное положение.
• По возможности на поврежденной стороне.

Цель:
Иммобилизация грудной клетки, уменьшение боли, улучшение вентиляции неповрежденного легкого .

4. Травма живота


• Положение на спине.
• Валик под полусогнутыми коленями.
• Валик под голову и плечи.
Цель:
Уменьшение напряжения мышц передней брюшной стенки, уменьшение боли
.



5. Травма конечностей
• Иммобилизация.
• Положение на спине или положение, наименее болезненное для пострадавшего.
• Подумать о противошоковой позиции, если пульс назапястье определяется с трудом!
Цель:
Уменьшение кровопотери, уменьшение боли, предупреждение дальнейших повреждений .




6. Травма таза
• Положение на спине.
• Колени слегка разведены.
• Валик под коленями.
• Подумать о противошоковой позиции, если пульс плохо определяется!
Цель:
Иммобилизация, уменьшение боли, предупреждение вторичных повреждений



II. Транспортные положения при отсутствии сознания


1. Стабильное боковое положение



• Положение на боку с опорой на колено полусогнутой ноги.
Цель: Поддержание проходимости дыхательных путей, предупреждение вдыхания рвотных масс или крови. Модификации стабильного бокового положения при травмах


2. Черепно-мозговая травма

Цель: Улучшение оттока венозной крови от мозга, предупреждение отека головного мозга .



3. Травматический шок (острая кровопотеря)

• Стабильное боковое положение.
• Ножной конец щита поднять под углом 15°.
Голову не запрокидывать.
Стабильное боковое положение с приподнятой верхней частью туловища.
Положение на неповрежденной стороне.



Цель: Поддержание проходимости дыхательных путей, улучшение сердцу .

4. Травма грудной клетки

• Стабильное боковое положение с приподнятой верхней частью туловища.
• Положение на поврежденной стороне.



Цель: Поддержание проходимости дыхательных путей, иммобилизация ребер, уменьшение боли, улучшение вентиляции неповрежденного легкого .


5. Травма позвоночника
• Положение на спине, на твердой поверхности.
• Прямое положение головы, голову не запрокидывать.
• Восстановление проходимости дыхательных путей тройным приемом
• Для поддержания проходимости дыхательных путей из различных типов приспособлений «рот устройство-рот» следует предпочесть воздуховод .
• Импровизированный шейный воротник.
Цель: Предупреждение вторичной травмы спинного мозга, иммобилизация перелома, поддержание проходимости дыхательных путей.

Ш. Положения при нарушениях кровообращения

1. Шок вследствие острой кровопотери (пульс на запястье не определяется)
• Поднять ноги на 30 - 45 см (рис 21), или
• Ножной конец импровизированных носилок поднять под углом 15°.
Цель:
Улучшение кровоснабжения жизненно важных органов, улучшение притока крови к сердцу.



2. Острая боль в области сердца
• Возвышенное положение с опущенными ногами.
Цель:Уменьшение избыточного притока крови к ослабленному сердцу



IV. Положения при нарушениях дыхания

1. Одышка

• Возвышенное положение верхней половины туловища.

Цель:Улучшение вентиляции легких .




2. Клокочущее дыхание, кашель с пенистой мокротой (отек легких)

• Сидячее положение.

• Конечности опущены вниз.

Цель:

Улучшение вентиляции легких (облегчение дыхания), снижение притока крови к сердцу .






Схема 1. Транспортные положения.