


Les Malassezioses

- ▶ Les malassezioses sont des mycoses dues à des levures lipophiles anciennement appelées *Pityrosporum orbiculare* et *Pityrisporum ovale*
- ▶ Il existe 13 espèces de *Malassezia* :
- ▶ *Malassezia furfur* , *Malassezia sympodialis* , *Malassezia sloofiae* , *Malassezia pachydermatis* , *Malassezia globosa* , *Malassezia obtusa* , *Malassezia restricta* , *Malassezia*
- ▶ Les levures de *Malassezia* sont kératinophiles lipodépendantes appartenant à la flore commensale de la peau de l'homme
- ▶ Elles sont responsables de PITYRIASIS VERSICOLOR chez l'homme , de dermite séborrheïque , du PITYRIASIS CAPITIS et plus récemment d'infections systémiques
- ▶ les espèces de *Malassezia* ont toutes la même morphologie , la différenciation se fait par biologie moléculaire
- ▶ Levures de 2 à 6 μ sous forme de petites bouteilles groupées en grappe de raisin avec des filaments courts qu'on peut ne pas retrouver
- ▶ Il s'agit d'une affection fréquente chez les personnes ayant une peau grasse qui souffre d'hyperhidration et aussi l'application de corps gras sur la peau (huiles solaires) , grossesse , hypercorticisme et immunodépression
- ▶ Certaines études parlent de patients prédisposés génétiquement
- ▶ **Cliniquement :**
- ▶ Le PITYRIASIS VERSICOLOR se présente sous forme de lésions de dépigmentation sur une peau noire et de lésions d'hyperpigmentation sur une peau blanche

- ▶ Le PITYRIASIS CAPITIS se présente sous forme de lésions croûteuses sans alopecies
- ▶ Ces lésions sont inesthétiques pour les patients
- ▶ Les lésions siègent au niveau du thorax , le cou mais peut s'étendre à tout le corps
- ▶ Ce sont des macules de couleur chamois , finement squameuses qui s'étendent de façon centrifuge
- ▶ Le prurit est inconstant
- ▶ Le pityriasis versicolor doit faire l'objet de diagnostic différentiel avec le vitiligo et les sclérodermies
- ▶ **Dermite séborrhéique :**
- ▶ Elle siège au niveau du visage favorisée par le stress et l'immunodépression
- ▶ Les lésions sont érythémato-squameuses prédominant au niveau des sourcils et le cuir chevelu
- ▶ **Pityriasis capitis :**
- ▶ Il est fréquent favorisé par le stress et la séborrhée
- ▶ Le prurit est fréquent et peut entraîner une chute de cheveux
- ▶ Les fongémies à Malassezia : elles sont rares et surviennent chez les prématurés et les personnes immunodéprimées sous alimentation parentérale par des intra lipides et la 1^{ère} chose à faire est de retirer le cathéter
- ▶



Diagnostic

- ▶ La lampe de WOOD qui montre une fluorescence jaunâtre
- ▶ Il se fait par SCOTCH TEST CUTANE : les levures apparaissent sous forme de petites bouteilles de 2 à 6µ de diamètre regroupées en grappe de raisin
- ▶ La culture se fait sur milieu de SABOURAUD additionné d'une source de lipides = HUILE D'OLIVE à 37°C
- ▶ Les colonies sont blanches , crémeuses au contact de l'huile

Une seule espèce pousse sans apport de lipides :
Malassezia pachydermatis

Traitement

- ▶ Kétoconazole gel moussant à 2% en topique
- ▶ Une application/semaine

- Pour les lésions étendues : kétoconazole comprimés pendant 10j avec vérifications des fonctions hépatiques