

АКУШЕРСТВО

Ви – фельдшер швидкої допомоги

1. Вагітність 40 тижнів, жінка скаржиться на схваткоподібні болі внизу живота, при огляді зліва від пупка пальпується голівка плода, серцебиття плоду 150 уд/хв.

- Встановіть попередній діагноз.
- Тактика. Продемонструйте на фантомі прийоми Леопольда-Левицького.

Ви - фельдшер швидкої допомоги

2. Вагітна 25 років, термін вагітності 10-11 тижнів, скаржиться на біль внизу живота, кров'янисті виділення зі статевих шляхів.

- Встановити попередній діагноз.
- Визначте тактику.
- Складіть набір для вишкрібання порожнини матки.

Ви - фельдшер ФАПУ.

3. Виклик до вдруге народжуючої. Вагітність доношена. Минуло 30 хв. від початку пологової діяльності. Води не відходили. При обстеженні: положення плода поздовжнє, передлежить голівка. АТ -150/100 мм рт.ст.. Набряки нижніх кінцівок. Роділля раптом зблідла, скаржиться на розпираючі біль у животі. Матка напружена, збільшився її лівий кут. Пульс -100 за хв., серцебиття плода глухе - 90 за хв. Зовнішньої кровотечі немає.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план Вашої допомоги.
- Продемонструйте (на фантомі) прийоми Леопольда.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

4. У роділлі пологи вдома, II період пологів. Потуги через 1-1,5 хв., по 40 - 50 сек. голівка візується.

- Встановити попередній діагноз.
- Складіть план Вашої допомоги.
- Продемонструйте (на фантомі) огляд пологових шляхів.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

5. Вагітність 6 тижнів, скарги на багаторазове блювання (10-12 раз), нудоту, слабкість, витікання слини. Пульс -78 за хв., температура -37,3°C.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте (на фантомі) бімануальне дослідження.

Ви - фельдшер ФАПУ

6. Первинно вагітна, 24 роки, термін вагітності 36 тижнів. Скарг немає.

- Провести вислуховування серцебиття плода на фантомі, якщо в дні матки визначається округлої форми балотуюча частина плода, спинка пальпується справа, над входом в малий таз пальпується неправильної форми частина плода, яка не балотується

Ви - фельдшер ФАПУ.

7. Пологи термінові вдома. При зовнішньому фельдшерському дослідженні: положення плоду поздовжнє, передлегла частина округлої форми, м'якуватої консистенції. Серцебиття 120 уд. за хв. вище пупка зліва. При внутрішньому акушерському дослідженні: відкриття маткового вічка повне, пальпується об'ємна м'яка частина, сідничні горби.

- Встановити попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструвати (на фантомі) метод Н.А. Цов'янова при сідничному передлежанні.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

8. У жінки 20 років вагітність 39тиж. Відчуття важкості, втоми, головний біль, набряк ніг. Збільшення ваги за тиждень на 700г. АТ -180/100мм рт.ст.

- Встановить попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте визначення білка в сечі.

Ви - фельдшер ФАП.

9. Вагітність 40 тижнів. Втрата свідомості, порушення дихання, клонічні судороги всіх м'язових груп, набряки рук, обличчя. АТ 175/100 - 185/115мм рт. ст.

- Встановить попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте (на фантомі) техніку введення роторозширювача і язикотримача.

Ви - фельдшер ФАП.

10. Пологи відбулися вдома. Зараз III період пологів, який триває 30 хвилин, є ознаки відокремлення плаценти. Кровотеча досягла 450мл.

- Встановить попередній діагноз.
- Складіть план вашої допомоги.
- Продемонструйте (на фантомі) всі ознаки відокремлення плаценти, виділити послід одним із зовнішніх методів.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

11. Вас викликали до вдруге родящої. Пологи відбулися на дому. Народився хлопчик вагою 4,2кг. Послід при огляді - цілий. В ранньому післяпологовому періоді почалась кровотеча. При пальпації через черевну стінку матка «м'яка», «плаваюча».

- Встановити попередній діагноз.
- Скласти план допомоги.
- Продемонструйте (на фантомі) алгоритм дій при кровотечі в ранньому післяпологовому періоді.

Ви - фельдшер здоров'я пункту

12. Вагітна 30 тижнів. Чергове обстеження. При огляді: живіт має форму поперечного овоїда. При проведенні зовнішнього акушерського дослідження висота стояння дна матки - 24см, з лівого боку матки визначається голівка плода. Серцебиття 120 уд. за хв. на рівні пупка.

- Встановить попередній діагноз.
- Складіть план допомоги.
- Продемонструйте (на фантомі) прийоми Леопольда.

Ви - фельдшер ФАП.

13. Роділля 24 роки, знаходиться у II періоді пологів. Положення плода повздовжнє, голівка врізується, серцебиття плода 120 за хв. На висоті потуги промежина кулеподібна, шкіра бліда.

- Встановити попередній діагноз.
- Складіть план допомоги.
- Продемонструйте (на фантомі) техніку перінеотомії.

Фельдшер медпункту

14. Жінка цікавиться на якому терміні вагітності необхідно встати на облік з приводу вагітності і як визначити дату пологів, якщо менструація була 1 квітня.

Ви - фельдшер медпункту

15. Жінка, 20 років, вагітність 7-8 тижнів. Турбує нудота, блювання 5-6 разів на добу, втратила 3кг маси тіла.

- Встановить попередній діагноз.
- Надайте рекомендації.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

16. Вас викликали до роділлі. Пологі термінові розпочалися вдома. Зараз період згнання. Пологі в передньому виді потиличного передлежання.

- Встановити попередній діагноз.
- Скласти план допомоги.
- Продемонструйте алгоритм надання акушерської допомоги в пологах (на фантомі).

Ви - фельдшер ФАПУ.

17. На черговому прийомі у вагітної, 20 років, фельдшер виявив тазове передлежання плода при вагітності 31-32 тижні.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план дій.
- Продемонструйте (на фантомі) прийом Леопольда.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

18. Вас викликали до роділлі. Відбулися термінові домашні пологи. Роділля в III період пологів. Ознаки відшарування плаценти відсутні. Кровотеча, яка досягла 300мл продовжується.

- Встановити попередній діагноз.
- Складіть план допомоги.
- Продемонструйте (на фантомі) ручне відділення плаценти.

Ви – фельдшер швидкої допомоги

19. Пологи на дому. Після народження плаценти у роділлі кровотеча. Матка скорочується погано, м'яка на дотик.

- Встановіть попередній діагноз.
- Визначте тактику.

Ви - фельдшер ФАПУ.

20. Вас викликали до другороділлі з загально рівномірним звуженим тазом. В пологах 1 годину. ОЖ - 100см., ВСДМ - 35см. Положення плода повздовжнє, передлежить голівка, с/б 120 за хв. нижче пупка зліва.

- Встановити попередній діагноз.
- Складіть план допомоги.
- Продемонструйте на фантомі ознаку Вастена, Цангеймейстра.

Ви – фельдшер швидкої допомоги

21. Первинно вагітна жінка, 34 роки, термін вагітності 36-37 тижнів. Скаржитися на головний біль, відчуття закладеного носу, болісні відчуття в ділянці шлунку, нудоту. АТ - 170/100 – 180/110мм рт. ст., набряки гомілок.

- Встановіть попередній діагноз.
- Визначте тактику.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

22. Строк вагітності 34тиж. Скарги на переймоподібний біль унизу живота. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка, серцебиття 130уд/хв нижче пупка зліва, підтікають навколоплідні води.

- Встановіть попередній діагноз.
- Скласти план дій.
- Продемонструйте техніку перінеотомії.

Ви - фельдшер ФАПУ

23. При проведенні вимірів з'ясували: ОЖ – 90см, ВСДМ – 30см.

- Визначте приблизну масу плода, строк вагітності.

Ви - фельдшер швидкої допомоги.

24. У жінки при вагітності 29тиж. виникла безболісна кровотеча серед повного благополуччя, форма і консистенція матки не змінилась, матка не болюча. Кровотеча зовнішня, АТ -100/80мм рт.ст., пульс - 86уд/хв.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план допомоги.
- Продемонструйте зовнішнє акушерське дослідження.

Ви – фельдшер швидкої допомоги

25. Четверта доба після пологів, у роділлі підвищилась температура тіла до 38°C , з'явилась біль внизу живота, лохії мутні з неприємним запахом.

- Для якого захворювання характерні ці симптоми?
- Провести бімануальне дослідження.

Ви - фельдшер ФАП.

26. До вас звернулася вагітна 29тиж. вагітності, зі скаргами на головний біль, мерехтіння, мушок перед очима, біль в епігастрії. АТ 170/110 - 175/115 мм рт.ст. За тиждень - збільшення ваги на 700г.

- Встановіть попередній діагноз.
- Складіть план допомоги.
- Продемонструвати техніку виконання в/в ін'єкції.

Ви - фельдшер швидкої допомоги

27. Роділля 29 років, народила живого, доношеного хлопчика. Пройшло 15 хвилин послідового періоду.

- Встановіть попередній діагноз.
- Визначте тактику.

Ви – фельдшер швидкої допомоги

28. У вагітної 28-30 тижнів, раптово почалась кровотеча, болі немає.

- Встановити попередній діагноз.
- Визначте тактику.
- Продемонструйте на фантомі прийоми Леопольда-Левицького.