

ОСТРЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИ

1. ВЕГЕТАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ОБМОРОК.

- *Опросник, симптомы для подбора препаратов*

- *Препараты:*

- Бриония
- Калькарея карбоника
- Коккулюс
- Кониум
- Гельземиум
- Карбо вегетабилис
- Табакум
- Пульсатилла
- Фосфор
- Силицея

ОПРОСНИК

Головокружение

1. В каком положении начинается:

- лежа
- сидя
- стоя

2. Где проявляется (в какой части головы)

3. От чего хуже/лучше

- вставание
- когда смотрит на движущиеся предметы
- в транспорте
- ношение очков

4. Как ощущается (качание, шатание, вращение, заваливание в сторону)

5. Сопутствующие симптомы

- тошнота
- рвота
- головная боль

ПРЕПАРАТЫ

✓ БРИОНИЯ

Ключевые слова: ХУЖЕ ОТ ЛЮБОГО ДВИЖЕНИЯ, ОЩУЩЕНИЕ БУДТО «ТОНЕТ В КРОВАТИ».

- Сильные приступы головокружения с ощущением будто ТОНЕТ В КРОВАТИ.
- Любое малейшее движение ухудшает состояние пациента; он должен быть в полном покое. Даже движение глазами вызывает тошноту и рвоту.
- Головокружение при движении или подъеме головы, при подъеме по утрам.
- Предметы кружатся, кажется, что они все кружатся в водовороте.
- Головокружение с рвотой, дурнота или обморок.

Модальности:

ХУЖЕ: ОТ ДВИЖЕНИЯ, при попытке встать с постели, в положении стоя.

ЛУЧШЕ: стоя в покое, лежа, в покое.

✓ КАЛЬКАРЕЯ КАРБОНИКА

Ключевые слова: ХУЖЕ ПРИ ПОДЪЕМЕ, ОТ БЫСТРОГО ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВОЙ

- Хронические и острые формы головокружения.
- Головокружение усиливается при ПОДЪЕМЕ по лестнице или НА ВЫСОТЕ, или даже когда видит кого-то на высоте.
- Головокружение от неожиданного движения или при повороте головы, после прогулки.
- Головокружение с головной болью, с тенденцией заваливаться вбок.
- Головокружение, как будто пациент вращается в вихре.
- Головокружение ощущается в макушке.

Модальности:

ХУЖЕ: от напряжения, после прогулки, до или вовремя менструации, от неожиданного движения головы, при подъеме, в покое, вставая, после сна

 КОККУЛЮС

Ключевые слова: ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ НОЧНЫХ БДЕНИЙ, ХУЖЕ ОТ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ, ТОШНОТА.

- Головокружение от ПОТЕРИ СНА.
- УКАЧИВАНИЕ при виде движущихся объектов или при наблюдении за окружающим из движущегося автомобиля. Морская болезнь.
- Истинное головокружение при пробуждении; пациент встает с постели с тошнотой, с ощущением будто комната вращается.
- Головокружение с сильнейшей тошнотой, которая вынуждает пациента лежать неподвижно.
- Головокружение с тенденцией заваливаться вбок.
- Пациентам тяжело говорить, они заикаются. Кажется, что шея слишком слабая, чтобы держать голову.
- Ощущение интоксикации.

Модальности:

ХУЖЕ: ОТ БЕССОННИЦЫ, ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ, при наблюдении за движущимися объектами, при подъеме с постели, во время езды, в положении стоя, сидя, от движения, от алкоголя.

ЛУЧШЕ: лежа на боку, лежа в кровати.

✓ КОНИУМ

Ключевые слова: ОЩУЩЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ. ХУЖЕ ЛЕЖА, ВСТАВАЯ, ПЕРЕВОРАЧИВАЯСЬ В ПОСТЕЛИ.

- Головокружение с ощущением вращения «как будто постель перевернулась» или «как будто все кружится в вихре».
- Головокружение, когда пациент переворачивается в постели, вставая, когда ложится, при повороте или быстром движении головы, во время головной боли.
- Головокружение часто связано с гормональным дисбалансом.
- Головокружение у пожилых людей.

Модальности:

ХУЖЕ: Лежа, переворачиваясь в постели, при движении головой или даже глазами, от вина, во время менструации.

ЛУЧШЕ: закрывая глаза, в покое.

✓ ГЕЛЬЗЕМИУМ

Ключевые слова: ЗАТЫЛОЧНОЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ЛУЧШЕ ОТ МОЧЕИСПУСКАНИЯ, ДРОЖЬ, ШАТАНИЕ, ТЯЖЕСТЬ В ГЛАЗАХ

- Головокружение начинается в ШЕЕ ИЛИ ЗАТЫЛКЕ и распространяется на всю голову или такое головокружение, когда кажется «будто падает с большой высоты».
- Головокружение со слабостью, дрожью, шатанием и тяжестью век; пациент едва может держать глаза открытыми.
- Головокружение облегчается после обильного мочеиспускания.
- Диплопия или другие нарушения зрения с головокружением.

- Головокружение при быстром повороте головы, во время беременности, менструации, от курения.

Модалности:

ХУЖЕ: утром, от напряжения, при ходьбе.

ЛУЧШЕ: закрывая глаза, после мочеиспускания.

 КАРБО ВЕГЕТАБИЛИС

Основная характеристика пациентов Carbo vegetabilis – пустота, которую можно наблюдать на всех уровнях. Человек чувствует, как будто жизнь покидает его, ощущает себя пустым мешком. Кровообращение ослаблено, что приводит к слабости и склонности к обморокам как в острых, так и в хронических состояниях.

ОПУСТОШЕННОСТЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ, ПЛОХОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ – СЛАБОСТЬ, УМОПОМРАЧЕНИЕ С ХОЛОДНЫМ ПОТООТДЕЛЕНИЕМ И ЖЕЛАНИЕМ, ЧТОБЫ НА НЕГО ПОДУЛИ

Психические симптомы:

- Опустошенность на эмоциональном уровне проявляется в виде безразличия, апатии, уныния и на психическом уровне в виде замедленного мышления, отупения, слабой памяти, путаницы, нерешительности.

Перед этими состояниями вы можете наблюдать раздражительность и гнев.

Пациент ведет себя резко и настроен критически.

- Беспокойство, когда человек закрывает глаза, вечером в кровати.

- Бред в темноте.

Физические симптомы:

- Оказывает влияние на венозное кровообращение, особенно капилляры.

- Плохое кровообращение и недостаточная оксигенация.

- Дезинтеграция.

- Плохие последствия изнурительной болезни (например, корь, скарлатина, интоксикация) и потеря жизненных жидкостей.

- Используется после анестезии, чтобы быстро восстановить пациента.

- Последние стадии болезни.

- УМОПОМРАЧЕНИЕ при подъеме, пробуждении, нагрузке.
- Умопомрачение с холодным потоотделением, особенно на лбу, с холодным дыханием, холодным языком, холодным лицом и общей холодностью тела.
- ЖЕЛАНИЕ, ЧТОБЫ НА НЕГО ПОДУЛИ.
- Тимпанит брюшной полости, хуже от приема пищи, жидкости, после дефекации. Лучше от отрыжки, метеоризма.
- Расстройство желудка, хуже от мороженого.
- Озноб.
- Пробуждение от холода конечностей.
- Человек всегда страдает от ринита.
- Кровотечение из слизистых или отверстий.
- Десны ноздреватые, отделены от зубов и легко кровоточат при их сосании или чистке.
- Головная боль или сужение головы, хуже от давления от шапки.
- Голова чувствительная от ходьбы на холодном воздухе.
- Человек чувствителен к обтягивающей одежде (особенно вокруг желудка и брюшной полости), лучше при ослаблении одежды.

Модальности:

ХУЖЕ: теплая влажная погода, оливковое масло, свинина, богатая жирами пища, масло и жир, во время приема пищи.

ЛУЧШЕ: нахождение под открытым небом, ослабление одежды, нахождение в положении лежа

ЖЕЛАНИЕ: соль, конфеты, кофе

ОТВРАЩЕНИЕ: жирное мясо, соль, молоко, мясо.

ТАБАКУМ

ТОШНОТА, ЛЕДЯНАЯ ХОЛОДНОСТЬ, ПОТ

Физические симптомы:

- МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ, ужасная слабость, ощущение тошноты в подложечной области живота, состояние улучшается на свежем холодном воздухе и при раскрывании брюшной полости.
- Смертельная тошнота с или без рвоты.
- Пациент влажный, холодный и бледный.
- Тошнота при беременности, с выделением мокроты.
- Тошнота усиливается при открывании глаз.
- Изнеможение и расслабление всей мышечной системы, со свободными выделениями.
- Ощущение, словно желудок свисает.
- Головокружение при открывании глаз.
- Атеросклероз, высокое кровяное давление, особенно у курильщиков.
- Запор, особенно у курильщиков.
- Икота после кашля.
- Желание табака.

Модальности:

ХУЖЕ: открывание глаз, вечер, температурные крайности – жара и холод.

ЛУЧШЕ: раскрывание брюшной полости, свежий воздух.

ПУЛЬСАТИЛЛА

Пациент Пульсатилла страдает от головокружения от заболеваний глаз, которые облегчает ношение хорошо подобранных очков; сопровождается тошнотой.

- Хуже в положении лёжа
- Хуже от движения
- Хуже от движения глаз
- Лучше в прохладном помещении
- Лучше от холодного воздуха

- Хуже как только пациентка входит в тёплое помещение, возникает тошнота, вплоть до рвоты
- Головокружение со рвотой после еды

✓ **ФОСФОР**

Ключевые слова: ХУЖЕ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ГЛАЗ, ВСТАВАЯ ПО УТРАМ, КОГДА СМОТРИТ ВВЕРХ ИЛИ вниз.

- Хроническое или периодическое головокружение.
- Один из основных препаратов для лечения синдрома Меньера со звоном в ушах.
- Головокружение от ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ГЛАЗ или потери жидкости.
- Головокружение, когда смотрит вверх, встает из положения сидя или лежа, когда смотрит вниз, при ходьбе.
- Головокружение от запаха цветов.
- Головокружение с шаткостью походки.
- Головокружение, когда лежит на левом боку.
- Как только пациент переворачивается на правый бок, головокружение прекращается.

Модальности:

ХУЖЕ: от напряжения глаз, утром при подъеме, когда смотрит вверх, после дефекации или потери жидкости, лежа на левом боку, от запахов.

ЛУЧШЕ: лежа на правом боку, когда ложится, после сна.

✓ **СИЛИЦЕЯ**

Ключевые слова: ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ В СОЧЕТАНИИ С ПОРАЖЕНИЕМ УШЕЙ ИЛИ СИНУСОВ, ЗАТЫЛОЧНЫЙ, ПОДНИМАЕТСЯ ВВЕРХ ПО СПИНЕ

- Головокружение, связанное с синуситом и заложенностью ушей. Синдром Меньера в сочетании с хроническим поражением синусов. Эпилептическое головокружение.
- Затылочное головокружение распространяется на всю голову.

- Головокружение, связанное с подавлением потоотделения, особенно подмышек или стоп.
- Головокружение с головной болью, с сонливостью, когда пребывает в полусне, с тенденцией заваливаться направо или назад.
- Головокружение поднимается вверх по спине в голову.

Модальности:

ХУЖЕ: лежа на спине, лежа на левом боку, от движения, езды верхом, вождения автомобиля, от ходьбы, когда смотрит вверх, сидит, от напряжения глаз.

ЛУЧШЕ: когда укутывает голову.