

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 12-18 серпня 2022 року.

Озимий ріпак – сходи, 2-4 листочки. Кукурудза – молочна, воскова стиглість. Соя – формування бобів. Цукрові буряки – ріст і формування коренеплодів. Соняшник – цвітіння, формування кошиків. Картопля – в'янення бадилля. Сад – ріст плодів.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимого ріпаку хрестоцвітими блішками в середній чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 100 % обстеженої площі (269 га).

В посівах кукурудзи злаковими попелицями в середній чисельності 10 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 7 % рослин на 6 % обстежених площ, бавовникової совки в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 15 % рослин на 93 % обстежених площ, гусеницями стеблового метелика в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому пошкоджено 7 % рослин на 77 % обстежених площ. Пухирчастою сажкою в середньому уражено 1 % рослин (на качанах – 85, на стеблах – 15 %) на 16 % обстежених площ, летючою сажкою в середньому уражено 2 % рослин (на качанах – 17, на стеблах – 41, на волоті – 42 %) на 5 % обстежених площ, гельмінтоспоріозом уражено 15 % рослин з розвитком хвороби 7 % на 14 % обстежених площ (2562 га).

В посівах сої павутинним кліщем в середній чисельності 2 екз. на лист в середньому пошкоджено 10 % рослин на 18 % обстежених площ, гусеницями акацієвої вогнівки в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 75 % обстежених площ. Аскохітозом уражено 1 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 7 % обстежених площ, антракнозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 18 % обстежених площ (141 га).

В посівах соняшнику гусеницями лучного метелика в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 10 % рослин на 23 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 7 % рослин на 40 % обстежених площ, геліхризовою попелицею за середньої чисельності 6 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 5 % рослин на 24 % обстежених площ, гусеницями соняшникової вогнівки в середній чисельності 1 екз. на кошик в середньому заселено 7 % рослин на 23 % обстежених площ, личинками соняшникової шипоноски в середній чисельності 15 екз. на рослину в середньому заселено 5 % рослин на 7 % обстежених площ. Фомозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 58 % обстежених площ, фомопсисом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 10 % обстежених площ, білою гниллю уражено 2 % рослин (прикоренева форма – 70 %, стеблова форма – 14 %, кошикова форма – 16 %) з

розвитком хвороби на кошиках 1 % на 21 % обстежених площ, сірою гниллю уражено 3 % рослин (прикоренева форма – 45, кошикова форма – 55 %) з розвитком хвороби на кошиках 1 % на 3 % обстежених площ. Соняшниковим вовчком уражено 1 % рослин за середній чисельності 1 екз. паразита на кожну рослину на 10 % обстежених площ (1057 га).

Личинками колорадського жука в середній чисельності 2 екз. на рослину в середньому заселено 4 % кущів томатів. Фітофторозом уражено 14 % рослин томатів, з розвитком хвороби 11 %. Макроспоріозом уражено 5 % рослин томатів з розвитком хвороби 2 %. Верхівковою гниллю уражено 3 % рослин томатів, 5 % плодів, з розвитком хвороби 3 % (присадибні ділянки).

На пізній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 9 екз. на заселену рослину пошкоджено 10 % рослин (присадибні ділянки).

На площах з-під зернових колосових культур середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 2, нір на колонію – 4 на 225 га обстеженої площі.