

Sergio
4-4-19

Rattlesnakes Awareness



Con el inicio de la primavera y las condiciones climáticas más cálidas, las serpientes de muchas especies diferentes han pasado su hibernación de invierno, lo que hace que los encuentros humanos con estas criaturas esquivas sean más probables. Aunque la mayoría de las serpientes nativas son inofensivas, el departamento de peces y vida silvestre de California recomienda cipw para evitar la venenosa serpiente de cascabel y saber qué hacer en caso de una huelga.

Las serpientes de cascabel se encuentran en toda California en una variedad de pastillas debajo de la madera. En general, las serpientes de cascabel no agresivas se retirarán si se les da suficiente espacio y no las pisa alguien que camina o trepa

En raras ocasiones, las mordeduras de serpientes de cascabel han causado lesiones graves, incluso la muerte. sin embargo, el riesgo de encontrarse con una serpiente de cascabel no debe disuadir a nadie de aventurarse al aire libre. Las lesiones ambientales de la enfermedad de California. la mayoría de las mordeduras se producen entre los meses de abril y octubre, cuando las serpientes y los humanos son más activos al aire libre. y hay precauciones que pueden y deben tomarse para disminuir las posibilidades de ser mordidos. Created By Sergio B.

With the onset of spring and the warmer weather conditions, snakes of many different species have passed their winter hibernation, which makes human encounters with these elusive creatures more likely. Although most native snakes are harmless, the California Department of Fish and Wildlife recommends cipw to avoid the poisonous rattlesnake and know what to do in the event of a strike.

Rattlesnakes are found throughout California in a variety of pills under the wood. In general, nonaggressive rattlesnakes will be removed if they are given enough space and not walked by someone who walks or climbs

Rarely, rattlesnake bites have caused serious injury, including death. however, the risk of encountering a rattlesnake should not deter anyone from venturing outdoors. The environmental lesions of the California disease. Most bites occur between the months of April and October, when snakes and humans are most active outdoors. and there are precautions that can and should be taken to reduce the chances of being bitten



Created By Sergio