

## **EXAMEN FINAL DE ANESTESIOLOGIA 12VO SEMESTRE**

### **1. Nombre al menos (3) medicamentos utilizados en la inducción de anestesia general:**

Midazolan.

Fentanyl.

Ketamina.

Propofol.

Tiopental.

Rocuronio.

Vecuronio.

Scoline.

### **2. Nombre al menos tres parámetros a ser evaluados por monitores en el paciente anestesiado:**

Electrocardioscopia.

Tensión arterial.

Pulsioximetría.

Capnografía.

Gases anestésicos.

Temperatura.

Relajación muscular.

### **3. Qué es lo básico que debe saber un Médico recién egresado para atender una emergencia sin importar donde se presente?**

Primeros auxilios.

### **4. Si está en sitio cualquiera y alguien necesita ayuda médica de emergencia y usted es el médico presente, y el individuo muere por inasistencia o asistencia inadecuada, cual podría ser la consecuencia para usted y por qué?**

Acción penal con posibilidad de cárcel por NEGLIGENCIA, IMPERICIA o IMPRUDENCIA.

### **5. Despues de haber asistido a la pasantía de anestesia, qué opina de la película " BAJO ANESTESIA"? Sea breve y conciso.**

Baja calidad técnica, mala asesoría médica: una cirugía cardíaca tiene más personal. No hay posibilidad de estar despierto en esa cirugía.

### **6. En Anestesia Peridural cuál es el tipo y calibre de la aguja que se usa y que planos o estructuras anatómicas deben ser atravesadas?**

Tipo de aguja: aguja de Tuohy calibre 16, 17 o 18.

Planos:

Piel.

Tejido celular subcutáneo.

Ligamento supra espinoso.

Ligamento inter espinoso.

Ligamento amarillo.

**7. En Anestesia Raquídea o subaracnoidea o en Punción Lumbar (PL) cuál es el tipo y calibre de la aguja que se usa y que planos o estructuras anatómicas deben ser atravesadas por dicha aguja?**

Tipo de aguja: aguja de PL calibre 19 a 29.

Planos:

Piel.

Tejido celular subcutáneo.

Ligamento supra espinoso.

Ligamento inter espinoso.

Ligamento amarillo.

Espacio Peridural.

Duramadre.

**8. La PL diagnóstica o terapéutica a qué nivel o espacio ínter vertebral debe realizarse y por qué?**

Por debajo de L1-L2 porque hasta el cuerpo de L1 llega el cono medular en adultos.

**9. Si se requiere abordaje de la vía aérea en orden de pericia cuáles serían los más capacitados?**

Anestesiólogos o residentes avanzados de Anestesia.

Emergenciólogos.

Intensivistas.

**10. Qué mide o es evaluado por el Capnografo?**

El CO<sub>2</sub> tele espirado.

**11. Qué o cuál componente de la máquina de anestesia impide la reinhalación de CO<sub>2</sub> en el paciente intubado en anestesia general y cuales otros beneficios tiene?**

El canister con absorbedor de CO<sub>2</sub>.

Beneficios:

Calienta y humidifica los gases.