




Tistelfjärilslarver

Larven har en **spolformad** kropp med en **framkropp** med huvud och en ledad **bakkropp**. Längs med kroppen har den andningshål.

På framkroppsdelen finns tre par **korta ben med klor**. Det är dessa fötter som sedan blir fjärilens ben.



På bakkroppsdelarna sitter **benpar** som egentligen inte är fötter utan mer till för att balansera.

Huvudet, har sex **punktögon** och stora **käkar**.

Ryggdelen är ofta täckt av **tätare** eller **glesare borst** eller hår.

Larven är **gråsvart med gula fält**.

Utveckling

Larven utvecklas i **ägget**, och kan efter ca **tre veckor** äta sig ur ägget. Det viktiga är nu att **växa**. Larvens hud växer eller **tänjs** inte när larven växer. Därför måste den byta hud flera gånger, den **ömsar**. Oftast ömsar den fyra gånger, innan den är fullvuxen **det är den efter 3-4 veckor**. När larven ömsat hud för sista gången övergår den i **puppstadiet**.

Skydd

En fjärilslarv kan **skydda** sig genom att ha starka färger eller mönster. Den kan vara giftig eller smaka otäckt. Tistellarven är svart eftersom den är aktiv på natten. Larver har ofta hår eller borst på kroppen för att vara **oapptitlig**.

Ordförklaring

spolformad	-	cylinder eller spiralformat
framkropp	-	del av kroppen som sitter fram
bakkropp	-	del av kroppen som sitter bak
ledad	-	kroppen har leder som kan böjas
andningshål	-	hål i kroppen som tar in luft
punktögon	-	små ögon som ser ut som prickar
benpar	-	människor har ett par ben
käkar	-	del som rör sig på huvudet
puppstadie	-	en insekt som utvecklas i ett skal
tänjs	-	något man drar ut
fält	-	en del av något
tätare	-	när något är nära
glesare	-	när något är långt isär
borst	-	styva hårstrå
oaptitilig	-	någotäckligt, man vill inte äta det