

**ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ЗАРАЗНОМУ УЗЕЛКОВОМУ (НОДУЛЯРНОМУ)
ДЕРМАТИТУ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА**



ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ (НОДУЛЯРНЫЙ) ДЕРМАТИТ – опасная инфекция крупного рогатого скота, наносящая огромный экономический ущерб.

Заразный узелковый (нодулярный) дерматит относится к карантинным заболеваниям и при возникновении устанавливаются ограничительные (карантинные) мероприятия.

Наряду с крупным рогатым скотом узелковым (нодулярным) дерматитом болеют овцы и козы. Человек к этому вирусу не восприимчив.

У заболевших животных температура тела повышается до 40°C, через 48 часов на коже шеи, груди, живота, конечностей, головы и вымени образуются плотные круглые узелки, поражаются глаза, слизистые оболочки дыхательного и пищеварительного трактов. Атипичная форма наблюдается у новорожденных телят и характеризуется диареей, лихорадкой при отсутствии поражений кожи.

Животные отказываются от корма, быстро худеют, лимфоузлы сильно увеличиваются. Источником инфекции служат больные, а также переболевшие в скрытой форме животные. При первичном возникновении болезни поражается от 5 до 50%, а в отдельных

случаях и до 100% животных.

Вирус выделяется с выдыхаемым воздухом, слюной, молоком, истечениями из носовой полости и глаз, экссудатами и поражёнными участками кожи и слизистых оболочек. Возбудитель болезни передаётся также трансмиссивно -кровососущими насекомыми.

Занос возбудителя в хозяйство происходит в результате несанкционированного ввоза крупного рогатого скота с территорий, неблагополучных по данному заболеванию.

Летальность при этой болезни не превышает 10%, однако экономический ущерб значительный, поскольку снижается молочная и мясная продуктивность. У репродуктивного поголовья развивается потеря воспроизводительной функции.

Специфические методы лечения данного заболевания не разработаны. Для профилактики узелкового (нодулярного) дерматита в настоящее время применяют вакцину против оспы овец и коз.

На ранее благополучных административных территориях Российской Федерации рекомендовано, всех больных животных подвергать вынужденному убою.

Для профилактики и недопущения данного заболевания в хозяйства необходимо выполнять следующие правила:

- Систематически проводить учет и идентификацию всех животных, имеющих в животноводческих и личных подсобных хозяйствах с постановкой на учет в ветеринарном учреждении региона и органах местного самоуправления;

- Осуществлять входной контроль с использованием дезбарьеров и средств индивидуальной защиты (сменная спецодежда, обувь);

- согласовывать с ветеринарной службой района планируемые покупки животных, убой и продажу. Не допускать ввод/ввоз животных из неблагополучных хозяйств, территорий, в том числе вакцинированных животных против ЗУД КРС вакциной из штамма Neethling,

- осуществлять проведение карантинных мероприятий в течение 30 дней в хозяйстве-отправителе и в хозяйстве-получателе;

- Немедленно сообщать о всех случаях внезапного падежа или одновременного заболевания нескольких животных;

- предоставлять ветеринарным специалистам по их

требованию животных для клинического осмотра, осуществления диагностических исследований и проведению вакцинации;

- проводить обработки крупного рогатого скота репеллентами и инсектицидами, в течение всего периода лёта кровососущих насекомых;

- убой животных производить только на специализированных убойных площадках и мясокомбинатах при наличии ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие хозяйства (ЛПХ), выполнение обязательной диагностики, вакцинации и противопаразитарных обработок.

В случаях обнаружения клинических признаков узелкового (нодулярного) дерматита у крупного рогатого скота немедленно информировать государственную ветеринарную службу района

БУОО «Свердловская райСББЖ»: п. Змиевка, ул. Ульяновская, 7. Контактный телефон: 8(486 45) 2-11-28; 8(486 45) 2-26-92;