ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS

3D Plot3

3D Plot3

3D Plot3

1 INTRODUÇÃO

Esta série de tutoriais sobre *Lógica Matemática* foi escrita usando o **Microsoft Windows 7 Ultimate**, **Microsoft Office 2013**, software matemática **Maple** versão 15, referências na internet, site [Wolfram|Alpha](#) e notas de aula do professor quando estudante. Ela cobre desde indução até quantificadores, passando pelos argumentos, implicações, tabelas-verdade etc.

Nós entendemos que você já tem conhecimento matemático suficiente e entende certas notações matemáticas de uso comum no meio acadêmico. Conhecimentos de internet e alguma linguagem de programação também são bem-vindas, mas não é condição necessária.

Não adotaremos um livro texto, mas você tem a liberdade de ler *Iniciação à Lógica Matemática*, Editora Nobel, de Edgard de Alencar Filho. Nele você encontrará todo o assunto que iremos abordar, mas não tão simplificado e com exemplos abundantes quanto aqui.

Se você seguiu todos os passos até aqui, está pronto para prosseguir com este tutorial.

2 PROPOSIÇÕES ASSOCIADAS A UMA CONDICIONAL

2.1 PROPOSIÇÃO RECÍPROCA

$$p \Rightarrow q: q \Rightarrow p$$

Como podemos ver foi feita uma troca entre a antecedente (p) e a consequente (q) para obter-se a recíproca cuja tabela esta abaixo:

p	q	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	V	F
F	F	V	V

Exemplo:

$p \Rightarrow q$: Se triângulo é equilátero, então é isósceles.

A recíproca da condicional é

$q \Rightarrow p$: Se triângulo é isósceles, então é equilátero.

(A condicional $p \Rightarrow q$ é verdadeira (V), mas sua recíproca $q \Rightarrow p$ é falsa (F)).

2.2 PROPOSIÇÃO CONTRÁRIA

Basta negar a antecedente (p) e a consequente (q) para obtermos a proposição contrária.

$$p \Rightarrow q: \neg p \Rightarrow \neg q$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$\neg p \Rightarrow \neg q$

V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	V
F	V	V	F	V	F
F	F	V	V	V	V

2.3 PROPOSIÇÃO CONTRAPOSITIVA

$$p \Leftrightarrow q: \neg q \Leftrightarrow \neg p$$

Para encontrarmos a contra positiva basta juntar os passos da recíproca e da contrária, ou seja, deve se inverter os lugares do antecedente e do consequente e negar ambos. A proposição contra positiva tem o mesmo resultado que a proposição original.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \Leftrightarrow q$	$\neg q \Leftrightarrow \neg p$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Exemplos:

$p \Leftrightarrow q$: Se Carlos é professor, então é pobre.

A contrapositiva é

$\neg q \Leftrightarrow \neg p$: Se Carlos não é pobre, então não é professor.

Portanto, $(p \Leftrightarrow q \Leftrightarrow \neg q \Leftrightarrow \neg p)$

p : x é menor que zero

q : x é negativo

$q \Leftrightarrow p$: Se x é negativo, então x é menor que zero.

A contrapositiva é

$\neg p \Leftrightarrow \neg q$: Se x não é menor que zero, então x não é negativo.

Portanto, $(q \Leftrightarrow p \Leftrightarrow \neg p \Leftrightarrow \neg q)$

2.4 TABELA-VERDADE DAS PROPOSIÇÕES ASSOCIADAS

p	q	$p \Leftrightarrow q$	$q \Leftrightarrow p$	$\neg p \Leftrightarrow \neg q$	$\neg q \Leftrightarrow \neg p$
---	---	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V

Equivalências

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow \neg q \leftrightarrow \neg p \text{ e } q \leftrightarrow p \Leftrightarrow \neg p \leftrightarrow \neg q$$

A condicional ($p \rightarrow q$) é equivalente a sua contrapositiva ($\neg q \rightarrow \neg p$) e a recíproca da condicional ($q \rightarrow p$) é equivalente à contrária da condicional ($\neg p \rightarrow \neg q$).

3 ÁLGEBRA DAS PROPOSIÇÕES I

3.1 PROPRIEDADES DA CONJUNÇÃO

A conjunção lógica tem algumas propriedades. Destacam-se:

- $p \wedge q \equiv q \wedge p$ ([comutativa](#))
- $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ ([associativa](#))
- $p \wedge q \equiv \neg(\neg p \vee \neg q)$ ([leis de De Morgan](#))
- $p \wedge \neg p \equiv F$
- $p \wedge V \equiv p$
- $p \wedge F \equiv F$
- $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
- $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ ([distributiva](#) em relação à [disjunção lógica](#))

O símbolo $\equiv$ significa “equivale logicamente a”.

3.1.1 " $\wedge$ " E "MAS"

Um assunto da lógica e da linguagem menos comentado é a regra da palavra "mas". Logicamente, a sentença "está chovendo, mas o sol está brilhando" é equivalente a "está chovendo e o sol está brilhando", então logicamente, "mas" é equivalente a "E". Entretanto, como demonstrado pela sentença precedente, "mas" e "E" são semanticamente distintos. A sentença anterior sugere que a última sentença é geralmente um contradição.

Uma forma de resolver esse problema de correspondência entre a lógica simbólica e a linguagem natural é observar que a primeira sentença (que usa "mas"), implica a existência de uma suposição escondida mas confundida, saber que o sol não brilha quando chove. Essa implicação captura a diferença semântica "E" e "mas" sem se perturbar com sua equivalência lógica.

3.2 PROPRIEDADES DA DISJUNÇÃO

A disjunção lógica tem algumas propriedades. Destacam-se:

- $p \vee q \equiv q \vee p$ ([comutativa](#))
- $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ ([associativa](#))
- $p \vee q \equiv \neg(\neg p \wedge \neg q)$ ([leis de De Morgan](#))
- $p \vee \neg p \equiv V$
- $p \vee F \equiv p$

- $p \vee V \equiv V$
- $p \vee (q \wedge p) \equiv p$
- $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ ([distributiva](#) em relação à [conjunção lógica](#))

3.3 PROPRIEDADES DA CONJUNÇÃO E DA DISJUNÇÃO

3.3.1 DISTRIBUTIVA

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

p	q	r	1 $q \vee r$	2 $p \wedge (1)$	3 $p \wedge q$	4 $p \wedge r$	(3) $\vee$ (4)
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

p	q	r	1 $q \wedge r$	2 $p \vee (1)$	3 $p \vee q$	4 $p \vee r$	(3) $\wedge$ (4)
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	V	V	F	F
F	F	V	F	V	F	V	F
F	F	F	F	V	F	F	F

3.3.2 ABSORÇÃO

$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$

$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

3.3.3 REGRAS DE DE MORGAN

Augustus De Morgan (1806-1871), analista, teórico de probabilidade e teórico em lógica inglês nascido na Índia, foi o primeiro professor de matemática na University College, em Londres, e o primeiro presidente da London Mathematical Society. Ele também abordou questões filosóficas, clarificou a natureza da [Indução](#) matemática, e generalizou a noção de álgebra, como também iniciou a revisão da tradicional lógica Aristotélica.

Primeiras leis de DE MORGAN

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

Essas regras podem exprimir-se dizendo que a negação transforma a conjunção em disjunção e a disjunção em conjunção.

As Regras de DE MORGAN mostram como é possível definir a disjunção a partir da conjunção e da negação, ou a conjunção a partir da disjunção e da negação.

$$p \vee q \Leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q)$$

$$p \wedge q \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q)$$

4 NEGAÇÃO DA CONDICIONAL

Do exposto até agora, a condicional $p \Rightarrow q$, equivale a $\neg p \vee q$.

Tem-se então: $\neg(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q)$. Aplicando o princípio da negação da disjunção resulta:

$\neg(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q)$, que por De Morgan nos dá

$$\neg(\neg p) \wedge \neg q \Leftrightarrow p \wedge \neg q$$

Portanto,

$$\neg(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$$

Assim, a negação da proposição "se chove então faz frio" é "chove e não faz frio".

5 NEGAÇÃO DA BICONDICIONAL

Da equivalência $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$, tira-se $\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow \neg[(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)]$. Usando a negação da conjunção:

$$\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow \neg[(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)] \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg q \vee p).$$

Aplicando a negação da disjunção nos dois termos, resulta:

$$\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$$

Usando a distributividade da disjunção em relação à conjunção:

$$\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \wedge \neg q) \vee q) \wedge ((p \wedge \neg q) \vee (\neg p))$$

Reaplicando a distributividade da disjunção em relação à conjunção:

$$\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (\neg q \vee q)) \wedge ((p \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee \neg p)).$$

Ora, $(\neg q \vee q)$ e $(p \vee \neg p)$ são verdades absolutas. O julgamento de uma proposição qualquer ligada a uma verdade absoluta pelo conectivo **e**, depende apenas da veracidade ou não de tal proposição.

Deste modo, conclui-se que:

$$\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg p)$$

Assim, a negação da proposição "Maria fica feliz se e somente se Pedro está presente" é "Maria fica feliz ou Pedro está presente e Maria não fica feliz e Pedro não está presente".

6 NEGAÇÃO CONJUNTA E DISJUNTA DE DUAS PROPOSIÇÕES ($\downarrow$ E $\uparrow$)

Os operadores $\downarrow$ e $\uparrow$ também são chamados conectivos de SCHEFFER.

A negação conjunta é representada pelo conector $\downarrow$, significa a negação de duas proposições envolvendo o conector **E**.

Exemplo: $p \wedge q \Leftrightarrow \neg p \downarrow \neg q$.

A negação disjunta é representada pelo conector $\uparrow$, significa a negação de duas proposições envolvendo o conector OU.

Exemplo: $p \vee q \Leftrightarrow \neg p \uparrow \neg q$.

Abaixo estão representadas as tabelas verdades das duas negações.

p	q	$p \downarrow q$		p	q	$p \uparrow q$
V	V	F		V	V	F
V	F	F		V	F	V
F	V	F		F	V	V
F	F	V		F	F	V

7 EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

1. Determinar:

a) a contrapositiva da contrapositiva de $p \Leftrightarrow q$.

A contrapositiva de $p \Leftrightarrow q$ é $\neg q \Leftrightarrow \neg p$. E a contrapositiva de $\neg q \Leftrightarrow \neg p$ é $\neg\neg p \Leftrightarrow \neg\neg q \Leftrightarrow p \Leftrightarrow q$.

b) a contrapositiva da recíproca de $p \Leftrightarrow q$.

A recíproca de $p \Leftrightarrow q$ é $q \Leftrightarrow p$. E a contrapositiva de $q \Leftrightarrow p$ é $\neg p \Leftrightarrow \neg q$.

c) a contrapositiva da contrária de $p \Leftrightarrow q$.

A contrária de $p \Leftrightarrow q$ é $\neg p \Leftrightarrow \neg q$. E a contrapositiva de $\neg p \Leftrightarrow \neg q$ é $\neg\neg q \Leftrightarrow \neg\neg p \Leftrightarrow q \Leftrightarrow p$.

Observe que a recíproca e a contrária são cada uma a contrapositiva da outra e que a condicional e a contrapositiva são cada uma a contrapositiva da outra.

8 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

1. Determinar:

a) a contrapositiva de $p \Leftrightarrow \neg q$.

b) a contrapositiva de $\neg p \Leftrightarrow q$.

c) a contrapositiva da recíproca de $p \Leftrightarrow \neg q$.

d) a recíproca da contrapositiva de $\neg p \Leftrightarrow \neg q$.

e) a contrapositiva da recíproca de $x = 0 \Leftrightarrow x < 1$.

f) a contrapositiva da contrária de $x < 1 \Leftrightarrow x < 3$.

2. Determinar $\neg(x = 0 \wedge x < 1)$.

3. Determinar $\neg(x < 1 \vee x < 3)$.

4. Determinar a contrapositiva $P \Leftrightarrow Q$, onde $P: \neg(x = 0 \wedge x < 1)$ e $Q: \neg(x < 1 \vee x < 3)$.

5. Determinar a contrapositiva da recíproca de $P \Leftrightarrow Q$, onde $P: \neg(x = 0 \wedge x < 1)$ e $Q: \neg(x < 1 \vee x < 3)$.

6. Determinar a contrapositiva da contrária de $P \Leftrightarrow Q$, onde $P: \neg(x = 0 \wedge x < 1)$ e $Q: \neg(x < 1 \vee x < 3)$.

10 TERMINAMOS

Terminamos por aqui.

Corra para o próximo tutorial.