

Nyeri : ☐ Ya ☐ Tidak

Nyeri mempengaruhi : ☐ Tidur ☐ Aktivitas Fisik ☐ Emosi

☐ Hubungan dengan orang lain ☐ Nafsu makan ☐ Konsentrasi

No	Lokasi	Skala	Faktor Pencetus	Kualitas	Frekuensi	Faktor Pereda
			☐ Bergerak	☐ Terbakar	☐ Menetap	☐ Istirahat
			☐ Banyak aktivitas	☐ Tumpul	☐ Intermiten	☐ Kompres panas
			☐ Saat menarik nafas	☐ Tertekan		☐ Kompres dingin
			☐ Suhu panas	☐ Menjalar		☐ Obat-obatan
			☐ Stres fisik	☐ Tajam		☐ Memegang area
			☐ Stres emosi	☐ Tertusuk		☐ Doa
			☐	☐ Berdenyut		☐

Pola Tidur ☐ Normal ☐ Sulit memulai tidur ☐ Insomnia ☐ Sering terbangun

Penggunaan obat tidur ☐ Tidak ☐ Ya

b. Pengkajian/Skrining Risiko Nutrisional menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Standar Deviasi (SD) <-2 ☐ Ya ☐ Tidak
- Penurunan berat badan dalam tiga bulan terakhir ☐ Ya ☐ Tidak
- Asupan makanan kurang dalam minggu terakhir ☐ Ya ☐ Tidak
- Menderita penyakit berat (dalam pengobatan intensif) ☐ Ya ☐ Tidak

Jika salah satu jawaban “Ya” maka beritahu Ahli Gizi untuk dilakukan Asesmen Gizi

Resiko Malnutrisi :

PT/TB : cm BB : kg

IMT/BMI : kg/m² LK : cm (untuk pasien 0-5 yang tidak bisa ditimbang)

LLA : cm (untuk pasien > 5 tahun yang tidak bisa ditimbang)

☐ Tidak nafsu makan ☐ Sulit menelan ☐ Mual ☐ Muntah
☐ Asupan kurang > 3 hari ☐ Asupan kurang > 5 hari ☐ t.a.m

c. Pengkajian Kebutuhan Fungsional:

Sensori : Pengelihatan	☐	Normal	☐	Kabur	☐	Kacamatan	☐	Lensa	☐
Pendengaran	☐	Normal	☐	Tuli kanan/kiri	☐	Alat bantu dengar kanan/kiri	☐		☐
Penciuman	☐	Normal	☐	Tidak	☐		☐		☐
Kognitif : Berespon sesuai terhadap stimulus verbal	☐		☐	Ya	☐	Tidak	☐		☐
Berespon sesuai stimulus fisik	☐		☐	Ya	☐	Tidak	☐		☐
	☐	Orientasi penuh	☐	Disorientasi orang	☐	Disorientasi waktu	☐	Disore	☐
