

Date:

Dear Parent or Guardian:

Your child may have recently been exposed to **impetigo**. Impetigo is a common skin infection caused by streptococcal or staphylococcal bacteria.

### **What are the symptoms of impetigo?**

Symptoms include small, red pimples or fluid-filled blisters. They are found most often on the face, hands, and feet, but can be anywhere on the body. The sores quickly rupture and ooze then develop a yellow-brown crust after a few days.

### **How is impetigo spread?**

Impetigo spreads from person to person by direct contact with the fluid from the blisters or from contaminated surfaces. Germs can enter through broken skin, like cuts or sores.

### **How is impetigo diagnosed and treated?**

Please contact your health care provider if your child has red pimples, fluid-filled blisters, or yellow scabs that will not go away. Generally, antibiotics are recommended to prevent spreading impetigo to others.

### **How do you control the spread?**

- Hand washing is the most important way to control the spread
- Clean and sanitize commonly touched surfaces and equipment
- Wash the child's clothing and towels daily – do not share towels
- Cut nails short to prevent damage from scratching
- Children with impetigo should be excluded from care until they have been on antibiotics for 24 hours
- Cover draining sores with a clean, dry dressing (bandage or gauze) while the child is in care

### **How do I get more information?**

For more information about impetigo, please contact your health care provider.

**Fecha:**

Estimado parent o tutor:

Es posible que su niño/a haya sido expuesto recientemente al **impétigo**. El impétigo es una infección común de la piel. Es causada por las bacterias, streptococcal o staphylococcal.

**¿Qué son los síntomas del impétigo?**

Los síntomas incluyen pequeñas pápulas rojas o ampollas llenas de líquido. Generalmente, se las encuentran en la cara, las manos, y los pies, pero aparecen en cualquiera parte del cuerpo. Las úlceras rompen y rezuman antes de forman una costra marrón amarillento oscuro.

**¿Cómo se transmiten impétigo?**

Se transmiten la infección por el contacto directo con el líquido de las ampollas. Las bacterias entrar por piel rota, como un corte o una úlcera.

**¿Cómo se diagnostica y se le da tratamiento al impétigo?**

Por favor, contactan con su médico si su niño/a tiene unas pápulas rojas, unas ampollas llenas de líquido, o unas costras marrones amarillentos oscuros que no mejoran. Generalmente, se recomiendan los antibióticos.

**¿Cómo se controla la propagación?**

- Lávese las manos frecuentemente y a fondo
- Limpie las superficies tocadas y el equipaje usado
- Lave la ropa y las toallas del niño cada día. No comparten las toallas.
- Córtese las uñas del niño para prevenir daño de rascarse
- Excluyan los niños con impétigo de la escuela hasta ellos hayan tomado antibióticos por 24 horas
- Cubra las úlceras mojadas con una venda mientras el niño está en la escuela

**¿Cómo puedo encontrar más información?**

Para más información sobre el impétigo, puede comunicarse con su médico.