تصنيع الأنواع الكيميائية Synthèse des espèces chimiques

نشاط 1: تعرف بعض دوافع تصنيع الأنواع الكيميائية
 يمثل الجدول التالي بعض المواد والأنواع الكيميائية البديلة لمواد وإنواع كيميائية طبيعية ، وبعض الدوافع التي تجعل الإنسان يقوم بتصنيعها

بعض دوافع التصنيع	مواد وانواع مصنعة	مواد وانواع طبيعية	المجال/المواد
	اسمدة	اسمدة طبيعية :	الفلاحة
 تزاید الطاب علی السمدة 	• الأسمدة الأزوتية	• الدمال	
- ب. الزيادة في المردود الفلاحي	 الأسمدة الفوسفاطية 	• روث البهائم	
و قلة السمدة الطبيعية	● نترات الأمونيوم	,	
🛭 قلة الموارد الطبيعية	انسجة مصنعة 💠	انسسجة طبيعية	النسيج
🛽 زيادة الطلب على الملابس	النيلون	• الصوف	
 الحصول على أنسجة بمواصفات خاصة) 	• الترغال	• القطن	
مريحة ، خفيفية ن متينة ، سهلة الصيانة ،	البوليتسر	● الحرير	
مناسبة الثمن(
 الملونات المصنعة أقل تكلفة 	الله مصنعة المصنعة المستعدة المستعدة المستعدد ال	المونات طبيعية	التلوين
 الحصول على ملونات متعددة غير موجودة في 	• الأنديكو المصنع	• المزعفران	
الطبيعة	• التارترازين	• الحناء	
 التحكم في نجاعة الدوية 	 أدوية مصنعة في المختبرات مثل: 	 ادویة مستخرجة من أعشاب طبیعیة 	الصيدلة
🛽 صناعة أدوية بكميات كافية	• الأسبيرين		
 تصنيع أدوية غير موجودة في الطبيعة 	 حمض الأسكوربيك – فيتامين C 		
🛽 كون المنتوج الطبيعي غير مقنن			
يد رأسي خروج الماء الدارد الخابط الخاليط موجلة سخانة	دخول		
 عدم توفر الأعشاب بكية وافرة يشكل بعضها خطورة علىالصحة 			
🛽 منتوجات طبيعية غير فعالة بشكل مطلوب	 الصابون ،مساحيق ومحالبل الغسيل 	 ♦ الرماد والمواد الذهنية 	النظافة

♦ استثمار:

من خلال الجدول أعلاه حدد أهم الدوافع التي تجعل الإنسان يلجا الى لتصنيع مواد وانواع كيميائية

أسيتات الليناليل C₁₂H₂₀O₂
 أسيتات الليناليل C₁₂H₂₀O₂

راينا أن أسيتات الليناليل $C_{12}H_{20}O_2$ هو اهم مكون للزيت العطرية المستخرجة من زهرة اللخزامي ، إلا أنه يمكن تصنيعه في المختبر بتفاعل اللينانول $C_{10}H_{18}O$ مع أندرديد الإيثانويك $C_{4}H_{6}O_{3}$

- مرحلة تفاعل اللينانول مع أندريد الإيثانويك:
- ✓ نضع اللينالول و 10 ml من أندريد الإيثانويك في حوجلة
 - ✔ ننجز التركيب التجريبي الممبن جانبه
- ✔ نسخن الخليط لمدة معينة ، وبواسطة المبرد الراسي تتكاثف الغازات المنبعتة ، فتتحول الى سوائل تعود الى الخليط المتفاعل ، وتسمسى هذه العملية التسخين بالإرتداد
 - مرحلة إزالة أندريد الإيثاثويك المتبقى:

Site: www.chtoukaphysique.com Gmail: prof.jenkalrachid@gmail.com Page 1

- نضيف الخليط الى كمية من الماء المقطر ، فيتفاعل الفائض المتبقي من أندريد الإيثانويك مع الماء ، فيعطي حمض الإيثانويك C2H4O2 الذي يبقى في الطور المائى للخليط
 - مرحلة استخراج أسيتات الليناليل من الخليط:

يتكون الخليط المحصل عليه من كورين:


- طور مائي، وطور عضوي يتكون أساسا من أسيتات الليناليل
- ✓ نقوم بفصل الطورين بواسطة أنبوب التصفيق
- ✔ ولإزالة ما تبقى من حمض الإيثانويك في الطور العضوي المحصل عليه ، نقوم يإضافة كمية قلقلة من هيدروجينوكربونات الصوديوم ثم نعيد عملية التصفيق من جديد فنحصل على أسيتات الليناليلالمصنع
 - ♦ استتثمار:
 - 1. حدد ظروف تفاعل اللينالول مع أندريد الإيثانويك ولماذا تسمى هذع العمليو بالتسخين بالإرتداد
 - 2. ما الدور الذي يلعبه المبرد الرأسي في التفاعل
 - 3. عبر كتابة عن التفاعل المحدث باستعمال أسماء المتفاعلات والنواتج, ثم الصيغ الإجمالية
 - 4. هل يمكن ان نقول أن المرحلة الثانية هي عملية استخراج بمذيب ؟ فسر ذلك
 - 5. اقترح طرق للتحقق من أن النوع الكيميائي المصنع هو أسيتات الليناليل
 - 6. للتحقق من نقاوة أسيتات الليناليل المصنع نستعمل طريقة التحليل الكروماتوغرافي، فنذيب الأنواع الكيميائية A و S و L و H في ثنائي كلوروميثان

A: أسيتات الليناليل الخالص. S: أسيتات الليناليل المصنع.

L: اللينالول : H : الزيت الأساسي للخزامي.

- 1. ماذا يمكن القول عن الناتج المصنع ؟ ؟
 - تعرف الأنواع الكيميائية المكونة له

Www.AdrarPhysic.Com



Site: www.chtoukaphysique.com Gmail: prof.jenkalrachid@gmail.com Page 2