

Chứng đỏ da

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

VIÊM NANG LÔNG — ban đỏ nốt, ban đỏ induratum, bệnh Weber – Christian
(viêm da nốt sốt tái phát)

NHIỄM TRÙNG — vi khuẩn, nấm

BỆNH VIÊM DA CƠ ĐỊA

THROMBOPHLEBITIS SIÊU MỀM

SINH LÝ HỌC

NGUYÊN NHÂN CỦA ERYTHEMA NODOSUM

- NHIỄM TRÙNG — vi khuẩn (liên cầu, bệnh yersiniosis), không điển hình (*Chlamydia pneumoniae*), lao, nấm (*coccidioidomycosis*, *histoplasmosis*, bệnh đạo ôn), bệnh phong
- INFLAMMATORY — IBD, SLE, Behçet
- VIÊM PHỔI — bệnh sarcoidosis, u lympho Hodgkin
- IATROGENIC — viên uống tránh thai, omeprazole, montelukast
- IDIOPATHIC

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG

TRÌNH BÀY TIÊU BIỂU - các nốt ban đỏ, đau đớn ở bề mặt trước của hai bên
ống chân và đôi khi đùi, thân và trên

tứ chi. Có thể tiến triển thành các tổn thương giống như vết bầm tím

sẽ giải quyết mà không để lại sẹo trong khoảng thời gian từ 2 đến 8 tuần. Các triệu
chứng khác bao gồm đau đa khớp,

sốt và khó chịu. Sự hiện diện của các triệu chứng GI và /

hoặc bệnh hạch vùng kín có thể giúp thu hẹp

đường kính

ĐIỀU TRA

NỀN TẢNG

- LABS — CBC, antistreptolysin-O titer, ANA
- VI SINH VẬT — C&S vết thương, C&S họng (cho
Streptococcus), xét nghiệm lao qua da
- HÌNH ẢNH — CXR

ĐẶC BIỆT

- SINH HỌC BẤT NGỜ

SỰ QUẢN LÝ

ĐIỀU TRỊ NGUYÊN NHÂN HIỂU

KIỂM SOÁT TRIỆU CHỨNG — NSAID, kali
iốt, glucocorticoid (đề phòng bệnh lao)