

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період 09 по 15 червня 2023 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь – колосіння. Озимий ріпак – формування стручків. Соняшник – листоутворення. Горох – цвітіння. Картопля – цвітіння. Соя – поява 5-го листка. Сад – утворення плодів.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці хлібними клопами за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 57 % обстежених площ, середня чисельність яйцекладок шкідника 0,3 екз. на кв.м на 39 % обстежених площ, личинками хлібних клопів за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 38 % обстежених площ, гусеницями зернової совки за середньої чисельності 0,6 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,5 % рослин на 6 % обстежених площ, злаковими попелицями за середньої чисельності 7 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 7 % рослин на 81 % обстежених площ, личинками хлібної п'явиці за середньої чисельності 1,3 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 2 % рослин на 23 % обстежених площ, злаковими трипсами в середній чисельності 6 екз. на колос заселено та пошкоджено 7 % рослин на 57 % обстежених. Борошнистою россою уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 4 % обстежених площ, бурюю іржею уражено 8 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 27 % обстежених площ, септоріозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 79 % обстежених площ (939 га).

В посівах озимого ячменю злаковими попелицями за середньої чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 1 % рослин на 8 % обстежених площ, хлібними клопами за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 57 % обстежених площ, злаковими трипсами в середній чисельності 3 екз. на колос заселено та пошкоджено 3 % рослин на 10 % обстежених. Гельмінтоспоріозом уражено 44 % рослин з розвитком хвороби 24 % на 85 % обстежених площ, септоріозом уражено 10 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 85 % обстежених площ (1149 га).

В посівах кукурудзи злаковими попелицями в середній чисельності 5 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 45 % рослин на 73 % обстежених площ, злаковими блішками в середній чисельності 3 екз. на кв.м пошкоджено 8 % рослин на 56 % обстежених площ (735 га).

В посівах гороху гороховим зерноїдом за середньої чисельності 4 екз. на 100 п.с. в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 100 % обстежених площ, попелицею за середньої чисельності 36 екз. на 100 п.с. в середньому заселено та пошкоджено 5 % рослин на 100 % обстежених площ (132 га).

В посівах соняшнику буряковою попелицею в середній чисельності 6 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 6 % рослин на 28 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 7 % обстежених площ, фомозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 10 % обстежених площ (1068 га).

В посівах озимого ріпаку личинками ріпакового насінневого прихованохоботника в середній чисельності 1 екз. на заселений стручок в середньому заселено та пошкоджено 10 % рослин на 33 % обстежених площ, личинками капустяної галиці (комарика) в середній чисельності 7 екз. на заселений стручок в середньому заселено та пошкоджено 8 % рослин та 12 % стручків на 62 % обстежених площ (211 га).

Колорадським жуком в середній чисельності 1,8 екз. на кущ заселено і пошкоджено 24 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 15 % кущів, личинками в середній чисельності 10 екз. на кущ заселено і пошкоджено 39 % кущів картоплі. Фітофторозом уражено 25 % рослин картоплі з розвитком хвороби 10 % (присадибні ділянки).

Фітофторозом уражено 10 % рослин томату з розвитком хвороби 3 % (присадибні ділянки).

На присадибних ділянках у ранній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 19 екз. на заселену рослину пошкоджено 14 % рослин, білокрилкою в середній чисельності 25 екз. на заселену рослину пошкоджено 100 % рослин.

В плодкових садах яблуневою попелицею в середній чисельності 6 екз. на лист пошкоджено 7 % листків в середньому на 100 % дерев на 100 % площ. Паршею яблуні уражено 3 % листків з розвитком хвороби 1 % та 1 % плодів з розвитком хвороби 1 % на 30 % дерев на 100 % площ (4 га).

На присадибних ділянках в садах яблуневою попелицею в середній чисельності 10 екз. на лист пошкоджено 10 % листків в середньому на 40 % дерев. Паршею яблуні уражено 5 % листків з розвитком хвороби 3 % на 20 % дерев. Борошнистою россою яблуні уражено 10 % листків з розвитком хвороби 5 % на 40 % дерев.