

TEST DE CONSEJOS PARA PORTADORES DE PRÓTESIS Y APARATOS DE ORTODONCIA

1. ¿Qué instrumento se recomienda para limpiar el espacio entre barras y mucosa en una sobredentadura?

- A. Cepillo eléctrico
- B. Hilo dental con enhebrador
- C. Irrigador bucal
- D. Cepillo lingual

2. ¿Qué procedimiento consiste en rellenar con resina acrílica zonas desajustadas de la prótesis?

- A. Rebase
- B. Recontorneado
- C. Pulido
- D. Recementado

3. ¿Qué característica comparten prótesis completas y sobredentaduras?

- A. No requieren higiene diaria
- B. Tienen pautas comunes de mantenimiento
- C. No necesitan revisiones
- D. No producen sensación de cuerpo extraño

4. ¿Qué elemento es más susceptible a caries en prótesis fija?

- A. Pónticos
- B. Pilares
- C. Cerámica
- D. Tornillos

5. ¿Cada cuánto debe revisarse una prótesis fija convencional?

- A. Cada año
- B. Cada tres meses
- C. Cada seis meses
- D. Cada dos años

6. ¿Qué instrumento puede emplearse para retirar un puente fijo?

- A. Fórceps de extracción
- B. Martillo levantapuentes
- C. Espátula de resina
- D. Cureta periodontal

7. ¿Qué tipo de pasta se recomienda para prótesis fija sobre implantes?

- A. Alta en flúor
- B. Sin flúor o bajo flúor
- C. Con abrasivos fuertes
- D. Con clorhexidina diaria

8. ¿Cuándo debe hacerse la primera revisión tras colocar una prótesis fija sobre implantes?

- A. A la semana
- B. A los seis meses
- C. Al año
- D. A los tres días

9. ¿Qué complicación es frecuente en implantes?

- A. Caries radicular
- B. Mucositis periimplantaria
- C. Fractura radicular
- D. Reabsorción pulpar

10. ¿Qué debe evitar un paciente con prótesis fija convencional?

- A. Alimentos muy duros
- B. Alimentos blandos
- C. Líquidos fríos
- D. Frutas frescas

11. ¿Qué elemento se usa para limpiar entre pónicos y encía?

- A. Cepillo duro
- B. Hilo especial con enhebrador

- C. Seda convencional
- D. Cepillo lingual

12. ¿Qué ocurre con el reborde alveolar con el tiempo?

- A. Aumenta de volumen
- B. Se reabsorbe
- C. Se mineraliza más
- D. Se vuelve más fibroso

13. ¿Qué deben hacer los padres si el aparato removible tiene tornillo?

- A. Activarlo según indicación del ortodoncista
- B. No tocarlo nunca
- C. Limpiarlo con alcohol
- D. Ajustarlo manualmente si molesta

14. ¿Qué riesgo aumenta en ortodoncia fija si no hay buena higiene?

- A. Fractura de brackets
- B. Caries y problemas gingivales
- C. Desgaste del esmalte por abrasión
- D. Reabsorción radicular inmediata

15. ¿Qué tipo de cepillo se recomienda en ortodoncia fija?

- A. Cepillo duro
- B. Cepillo especial para ortodoncia
- C. Cepillo infantil
- D. Cepillo lingual

16. ¿Qué sensación es común al inicio del uso de prótesis sobre implantes?

- A. Hipersalivación permanente
- B. Sensación de cuerpo extraño
- C. Pérdida del gusto
- D. Dolor intenso continuo

17. ¿Qué debe hacer el paciente si quedan alimentos alrededor de la prótesis fija?

- A. Ignorarlo
- B. Ajustarla en casa
- C. Consultarlo al dentista
- D. Retirla y recolocarla

18. ¿Qué puede causar aflojamiento de una prótesis sobre implantes?

- A. Caries en el implante
- B. Desatornillado de tornillos
- C. Reabsorción pulpar
- D. Hipersensibilidad dentinaria

19. ¿Qué parte se limpia igual que dientes naturales en sobredentaduras?

- A. Barras
- B. Implantes
- C. Encías, lengua y mejillas
- D. Tornillos

20. ¿Qué característica tienen las placas de ortodoncia removible?

- A. Son más resistentes que las prótesis
- B. Son más frágiles y los alambres se desajustan
- C. No requieren higiene
- D. No necesitan manipulación