

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 27 вересня по 03 жовтня 2024 року.

Озимий ріпак – сходи. Кукурудза – повна стиглість, збирання. Соняшник – повна стиглість, збирання.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимого ріпаку хрестоцвітими блішками в середній чисельності 1,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 16 % рослин на 70 % обстеженої площі, гусеницями капустяного білана за середньої чисельності 5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 12 % рослин на 30 % обстежених площ, гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 30 % обстежених площ, білокрилкою за середньої чисельності 4 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % рослин на 11 % обстежених площ (280 га).

В посівах кукурудзи гусеницями бавовникової совки за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 8 % рослин на 57 % обстежених площ, гусеницями стеблового метелика за середньої чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 5 % рослин на 100 % обстежених площ. Пухирчастою сажкою в середньому уражено 3 % рослин (на качанах 50 %, на стеблі 50 %) на 43 % обстежених площ, фузаріозом в середньому уражено 3 % качанів на 71 % обстежених площ (417 га).

В посівах соняшнику гусеницями бавовникової совки за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 11 % обстежених площ. Фомозом уражено 12 % рослин з розвитком хвороби 7 % на 2 % обстежених площ, білою іржею уражено 10 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 65 % обстежених площ, бурюю сухою гниллю кошика уражено 8 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 65 % обстежених площ, білою гниллю уражено 6 % рослин (прикоренева форма - 33 %, стеблова форма - 22 %, кошик – 45 %) з розвитком хвороби 2 % на 6 % обстежених площ, сірою гниллю уражено 5 % рослин (прикоренева форма - 14 %, стеблова форма - 13 %, кошик – 73 %) з розвитком хвороби 3 % на 29 % обстежених площ (639 га).

На площах з-під соняшнику середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 2, нір на колонію 6 на 100 % обстеженої площі 85 га, на площах з-під кукурудзи мишоподібних гризунів не виявлено, на площах з-під сої середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 2, нір на колонію 2 на 100 % обстеженої площі 220 га, на площах з-під зернових середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію 3 на 100 % обстеженої площі 92 га, на неорних площах середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію 6 на 100 % обстеженої площі 6 га.