

ENTIDAD	ANTICUERPO	PATRON ANA+	Comentarios	SISTEMA HLA
Lupus	Anti-DNA nativo (+): nDNA-ds (+)	PATRON ANA+ PERIFERIC O O ANULAR	También moteado o Inucleolar Auto-anticossos antinuclears	
Lupus x fármacos	-Ac Antihistonas (+) y nDNA-ds (-)	PATRON ANA+ HOMOGENE O O DIFUSO	Anti Histones	
Hepatopatía Cronica Autoimmune	Patrón de Membrana (+) LKM-1		Anti LKM	
Cirrosis Biliar Primaria	Ac mitocondriales		Auto anticossos antimitocondrials	
Sjögren	(moteado fino/núcleo SSA-Ro			
Esclerodermia	Scl-70(topoisomerasa) con ENAS (-)	PATRON ANA+ MOTEADO O NUCLEOLAR	Anti-SCL70	
Polimiositis miositis	Ac Anti PM.Scl JO-1	JO1 se positiviza cuando fibrosis pulmonar	Anti-JO1 Anti-muscul estriat	
CREST	Slc-70 centrómero		Anti-SCL70 Anti-centròmer	
A.Reumatoidea	Factor reumatoide Citrulinados	PATRON ANA+ MOTEADO O NUCLEOLAR	Factor reumatoide Anti-pèptids-citrulinats	(AR juvenil)= B27
Celiaquia	Gliadina, endomisio transglutaminada	Se usa el anti transglutaminada	Estudi malaltia celiaca	HLADQ8/2 90% pacientes con celiacia DQ2+; 10% restante mayoritariamente DQ8+
Atrofia gástrica Anemia perniciosa	Celula parietal gástrica, Factor intrínseco	Se usa anti- factor intrínseco	Anti-cel.lules parietals Anti-factor intrínsec	
Diabetes I	GAD		Anti-GAD	DR4

			Anti-Illots pancreatics	DR3
PAN (panarteritis nodosa)	A-ANCA		mieloperoxidasa	
Goodpasture	Membrana basal glomerular			
Pénfigo vulgar	Desmogleina 3			DQB1
Miastenia gravis	Receptor acetilcolina			
Hashimoto	Tiroglobulina Peroxidasa tiroidea		Anti-mieloperoxida sa	
Graves	Receptor TSH		Anti-receptors TSH	
Espondilitis Anquilopoyética				B27
Síndrome Reiter				B27
Narcolepsia				DR2/DR15