

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 26 серпня по 01 вересня 2022 року.

Озимий ріпак – сходи, 2-4 листочки. Кукурудза – воскова стиглість. Соя – формування бобів. Цукрові буряки – ріст і формування коренеплодів. Соняшник – цвітіння, формування кошиків. Картопля – в'янення бадилля. Сад – ріст плодів.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимого ріпаку хрестоцвітими блішками в середній чисельності 5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 100 % обстеженої площі, несправжніми гусеницями ріпакового пильщика в середній чисельності 2 екз. на рослину в середньому пошкоджено 2 % рослин на 100 % обстежених площ (180 га).

В посівах кукурудзи гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 88 % обстежених площ, гусеницями стеблового метелика в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому пошкоджено 6 % рослин на 81 % обстежених площ. Пухирчастою сажкою в середньому уражено 3 % рослин (на качанах – 48, на стеблах – 52 %) на 87 % обстежених площ, летючою сажкою в середньому уражено 2 % рослин (на качанах – 32, на волоті – 68 %) на 30 % обстежених площ, фузаріозною гниллю уражено 10 % качанів на 12 % обстежених площ (652 га).

В посівах сої павутинним кліщем в середній чисельності 4 екз. на лист в середньому пошкоджено 8 % рослин на 41 % обстежених площ, гусеницями акацієвої вогнівки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 22 % обстежених площ. Аскохітозом уражено 10 % рослин з розвитком хвороби 7 % на 31 % обстежених площ, антракнозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 4 % обстежених площ, септоріозом уражено 8 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 37 % обстежених площ (322 га).

В посівах соняшнику гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 5 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,6 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 6 % рослин на 19 % обстежених площ, геліхризною попелицею за середньої чисельності 14 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 7 % рослин на 13 % обстежених площ, гусеницями соняшникової вогнівки в середній чисельності 1,2 екз. на кошик в середньому заселено 7 % рослин на 13 % обстежених площ. Фомозом уражено 12 % рослин з розвитком хвороби 7 % на 49 % обстежених площ, фомопсисом уражено 17 % рослин з розвитком хвороби 7 % на 9 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 8 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 6 % обстежених площ, борошнистою росою уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 5 % обстежених площ,

іржею уражено 8 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 24 % обстежених площ, білою гниллю уражено 3 % рослин (прикоренева форма – 63 %, стеблова форма – 17 %, кошикова форма – 20 %) з розвитком хвороби на кошиках 1 % на 28 % обстежених площ, сірою гниллю уражено 5 % рослин (прикоренева форма – 43, стеблова форма – 13 %, кошикова форма – 44 %) з розвитком хвороби на кошиках 2 % на 19 % обстежених площ. Соняшниковим вовчком уражено 3 % рослин за середній чисельності 1 екз. паразита на кожну рослину на 10 % обстежених площ (1697 га).

В посівах цукрових буряків церкоспорозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 100 % обстежених площ (78 га).

Фітофторозом уражено 36 % рослин томатів, з розвитком хвороби 17 % (присадибні ділянки).

На пізній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 14 екз. на заселену рослину пошкоджено 31 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 4 екз. на заселену рослину пошкоджено 45 % рослин, білокрилкою в середній чисельності 12 екз. на заселену рослину пошкоджено 15 % рослин, гусеницями капустяної совки в середній чисельності 1,1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 7% рослин, гусеницями капустяного білану в середній чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин (присадибні ділянки).

На площах з-під зернових колосових культур середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1,1, нір на колонію – 4 на 100 % обстеженої площі 187 га.

В плодівих садах гусеницями яблуневої плодожерки пошкоджено 9 % плодів падалиці в середньому на 40 % дерев. Паршею яблуні уражено 11 % листків з розвитком хвороби 8 % та 7 % плодів з розвитком хвороби 4 % на 30 % дерев на 80 % обстеженої площі, плодовою гниллю в середньому уражено 15 % плодів падалиці під 42 % дерев на 100 % обстеженої площі (5 га).