

Definición da OMS da discordancia de xénero

O que na anterior CIE-10 era "*Disforia de Xénero*" clasificada dentro do Capítulo IV, de Trastornos Sexuais e Saúde Sexual (*Trastornos ou enfermidade*), a OMS acordou clasificar, na nova [CIE-11](#), como "*Discordancia de Xénero*" dentro dun novo Capítulo XVII, de Condicións relacionadas coa saúde sexual (*Condición de Saúde*) que entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2022. O que axudará na redución do "*estigma cara a esta poboación, asegurando ao tempo a atención de calidade para a transformación corporal segura e baixo supervisión médica que podería requirirse*".

Que é a 11ª Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE-11) da OMS?

A undécima edición da Clasificación Estatística Internacional de Enfermidades e Problemas de Saúde Relacionados ([CIE-11](#)) [1] é un documento que proporciona datos e vocabulario estandarizados para axudar a diagnosticar e monitorizar problemas de saúde en todo o mundo. Inclúe códigos revisados da anterior versión, a CIE-10. Os profesionais da saúde utilizan o sistema internacional de códigos para clasificar unha enfermidade ou condición de saúde para usos múltiples. Estes códigos revisados espérase que impacten nas provisións de coidado e financiamento da saúde dos Estados.

A CIE-11 foi aprobada o 18 de xuño de 2018 e **entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2022** para substituír a anterior clasificación ([a CIE-10](#)), que está en vigor desde 1990. Xa que logo, é importante sinalar que en calquera caso a CIE-11 non se atopa en vigor aínda.

Que di a CIE-11 sobre a transexualidade?

A Clasificación Internacional de Enfermidades da OMS de 2018 ([CIE-11](#)) continúa incluíndo a transexualidade no seu articulado, aínda que cun termo diferente e baixo outro epígrafe que a anterior CIE de 1990: a CIE-11 extrae a "*disforia de xénero*" do "*Capítulo sobre Trastornos Mentais e do Comportamento*", pasando a chamala "*discordancia de xénero*" e a situala debaixo dun epígrafe titulado "*condicións relativas á saúde sexual*".

Ademais, é importante subliñar que o articulado da OMS segue falando a necesidade dun diagnóstico para determinar a "*discordancia de xénero*". Igualmente, a OMS tamén sinala que a discordancia de xénero, no caso do seu diagnóstico na infancia, debe "*persistir aproximadamente durante dous anos*". Precisamente a Lei de 2007 actualmente vixente en España refírese a **un proceso de seguimento de polo menos dous anos de duración** que son necesarios antes de aceptar o cambio rexistral do sexo nos documentos.

A CIE-11 da OMS tamén apunta: "*As variacións no comportamento de xénero e as preferencias non son por si soas unha base para determinar o diagnóstico*". Isto é importante porque abunda no feito de que o diagnóstico require o máximo rigor e xa que logo o mero comportamento da infancia e as persoas adultas en contra dos roles convencionais de xénero non pode utilizarse para diagnosticar a **discordancia de xénero**.

Tamén é relevante sinalar que mentres que a 10ª Clasificación Internacional de Enfermidades, que entrou en vigor en 1990, eliminou a homosexualidade da súa articulado,

a 11ª Clasificación continúa incluíndo a transexualidade na súa articulado, aínda que sexa co término "*discordancia de xénero*" e baixo outro epígrafe.

Definicións da "discordancia de xénero" na CIE-11

As definicións da OMS na CIE-11 relativas á discordancia de xénero inclúense de forma literal a continuación:

Definición de discordancia de xénero [2]:

A discordancia de xénero caracterízase por unha marcada e persistente discordancia entre o xénero experimentado da persoa e o sexo asignado. As variacións no comportamento de xénero e as preferencias non constitúen por si soas a base para asignar os diagnósticos neste grupo.

Definición de discordancia de xénero na adolescencia ou idade adulta [3]:

A discordancia de xénero na adolescencia ou idade adulta caracterízase por unha discordancia marcada e persistente entre o xénero experimentado pola persoa e o sexo asignado, o que a miúdo conduce a un desexo de "*transición*" para vivir e ser aceptada como unha persoa do xénero experimentado, xa sexa por medio dun tratamento hormonal, intervención cirúrxica ou outros servizos de saúde, para que o corpo poida aliñarse, tanto como o desexo e na medida do posible, co xénero experimentado. O diagnóstico non se pode facer antes do inicio da puberdade. As variacións no comportamento de xénero e as preferencias non constitúen por si soas unha base para determinar o diagnóstico.

Definición de discordancia de xénero na infancia [4]:

A discordancia de xénero na infancia caracterízase por unha discordancia marcada entre o xénero experimentado ou expresado e o sexo asignado en nenos e nenas prepúberes. Inclúe un forte desexo de ser dun xénero diferente ao do sexo asignado; unha forte aversión por parte da nena ou do neno a súa anatomía sexual ou ás características sexuais secundarias previstas, ou un forte desexo por ter as características sexuais secundarias primarias ou previstas que coinciden co xénero experimentado; e xogos imaxinarios, xoguetes, xogos ou actividades e compañeiros de xogo que son típicos do xénero experimentado en lugar dos do sexo asignado. A discordancia debe persistir aproximadamente durante dous anos. As variacións no comportamento de xénero e as preferencias non son por si soas unha base para determinar o diagnóstico.

[1] CIE-11 (who.int).

[2] Discordancia de xénero (who.int).

[3] Discordancia de xénero na adolescencia ou idade adulta (who.int).

[4] Discordancia de xénero na infancia (who.int).