Занятие № Группа ХКМ 1/1 Дата: 27.02.2024

Тип занятия: комбинированное занятие

Тема занятия: «Степенная функция, ее свойства»

Цель занятия:

Деятельностная:

– формирование у учащихся умений оперировать понятиями корень n-ой степени, умение сознательно и рационально использовать свойства корня при решении различных задач.

Содержательная:

– сформировать представление о корне n-ой степени, свойствах корня при решении различных задач;

– расширить знания учеников за счет включения новых определений: корень n-ой степени из действительного числа, арифметический корень квадратный, иррациональное число;

– познакомиться с задачами на использование свойства корня.

Оборудование занятия: доска, учебник.

План занятия:

1. Понятие корня n-ой степени из действительного числа.
- арифметический корень квадратный;
- корень четной степени из неотрицательного числа;
- корень нечетной степени из отрицательного числа.

2. Свойства корня n-ой степени.

3. Разбор типовых задач.

Ход занятия

1. Понятие корня n-ой степени из действительного числа.

Арифметический корень квадратный

На данном занятии мы рассмотрим понятие корня n-ной степени из действительного числа, дадим строгие определения и решим различные примеры на практическое применение данной конструкции.

Мы довольно долго не знали, что такое корень n-ой степени из действительного числа, и умели обходиться без этого понятия, но потом появились случаи, в которых обойтись без него уже невозможно.

Рассмотрим несколько простейших примеров.

Пример 1: $x^2 = 1$

Решение:

Способ 1, аналитический. Перенесем все члены в левую часть уравнения так, чтобы справа остался 0: $x^2 - 1 = 0$. Далее разложим на множители:
$(x + 1)(x - 1)=0$.


Каждый множитель приравниваем к нулю:

$$\left[\begin{array}{l}(x+1)=0\\(x-1)=0\end{array}\right.$$

Получаем ответ:

$$\left[\begin{array}{l}x=1\\x=-1\end{array}\right.$$

Способ 2, графический. Построим кривую $y=x^2$ и прямую y=1. Получим и в точках пересечения графиков.



Ответ: x=1, x= –1.

Для решения этой задачи нам не потребовалось никаких новых методов.

Пример 2: $x^2 = 4$

Решение:

Способ 1. $x^2 - 4 = 0$. Разложим на множители: (x + 2)(x – 2)=0. Каждый множитель приравниваем к нулю:

$$\begin{cases} (x+2) = 0 \\ (x-2) = 0 \end{cases}$$


Получаем ответ:

$$\begin{cases} x = 2 \\ x = -2 \end{cases}$$

Способ 2, графический. Построим график для системы, где первое уравнение – левая часть заданного выражения ($y=x^2$), второе – правая (y=4):

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = 4 \end{cases}$$

Ответами будут точки пересечения графиков, т. е. ч=2 и x=–2.



Ответ: x=2, x= –2.

После решения двух задач нужды в новом слове не обнаружено.


Пример 3: $x^2=3$

Решение:

Способ 1, аналитический. $x^2–3=0$. Пытаемся разложить на множители, но ничего не выходит. Попробуем другой способ.

Способ 2, графический. Построим график для системы, где первое уравнение – левая часть заданного выражения ($y=x^2$), второе – правая (y=3):

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = 3 \end{cases}$$



Видим, что графики пересекаются, а значит, ответы все же есть. Назовем их корень квадратный из 3 и минус корень квадратный из 3:

$$\begin{cases} y = -\sqrt{3} \\ y = \sqrt{3} \end{cases}$$

Ответ: x=√3, x= –√3.


Определение:

Квадратный корень из трех – это иррациональное число, приближенное к десятичной дроби (√3≈1,7). Так как √3>0, в дальнейшем будем считать его арифметическим корнем.

Понятие и определение корня четной степени из неотрицательного числа

Теперь нам нужно определить корень n-ой степени из действительного числа. Рассмотрим еще один пример.

Пример 4*: $x^n=a$,* где a≥0, n=2,4,6, …



Уравнение имеет 2 корня: $x = \sqrt[n]{a}$ и $x = -\sqrt[n]{a}$.


Определение:

Корнем n-ой степени из неотрицательного числа *a* называют такое неотрицательное число, которое при возведении в степень *n* дает в результате число *a*. Т. е. если $x = \sqrt[n]{a}$, то $x^n = a$. Из этого следует тождество $(\sqrt[n]{a})^n = a$.

Напомним, что у любой функции, в том числе и у данной, есть 2 задачи: прямая (по данному x найти y) и обратная (по данному y, в данном случае равному a, найти x). Если значение a положительное и n четное, то значение y достигается при двух значениях аргумента – положительном и отрицательном. Положительное значение аргумента называется корнем n-ной степени из a, или арифметическим корнем n-ной степени из a.

Понятие и определение корня нечетной степени из отрицательного числа

Перейдем к нечетным степеням. Начнем с $n = 3$.



Свойства функции $y = x^3$ отличаются от предыдущих. Напомним, что функция нечетная, график ее симметричен относительно начала координат; она принимает все значения от $-\infty$ до $+\infty$, а значит, любое свое значение *y* принимает при единственном значении *x*. Например, $x^3 = 1, x = 1$; $x^3 = 2, x = \sqrt[3]{2}$; $x^3 = 8, x = 2$; $x^3 = -8, x = -2$; $x^3 = -5, x = -\sqrt[3]{5}$. По графику функции находим решения.

Итак, уравнение $x^3 = a$ имеет единственный корень. Если этот корень неотрицательный, он называется арифметическим корнем, в противном случае – минус арифметическим корнем.

Если n – любое нечетное число, график функции x^n имеет тот же вид и те же свойства, что и x^3: функция нечетная, график симметричен относительно начала координат, область значений от $-\infty$ до $+\infty$, любое значение, в том числе и отрицательное, функция принимает при единственном значении аргумента.

Определение:

Корнем нечетной степени из отрицательного числа a при n=3,5,… называют такое отрицательное число, которое, будучи возведено в степень n, дает в результате число a. Например, $\sqrt[5]{(-1)}=1$ т. к. $(-1)^5=-1$; $\sqrt[5]{(-32)}=-2$ т. к. $(-2)^5=-32$.

Понятие корня n-ой степени из действительного числа позволяет уверенно решать степенные уравнения.

2. Свойства корня n-ой степени.

Обзор свойств корня n-й степени из неотрицательного числа.

$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}$, при $a \geq 0, b \geq 0, n = 2,3,4 \ldots$ *(теорема 1);*

$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$, при $a \geq 0, b > 0, n = 2,3,4 \ldots$ *(теорема 2);*

$\left(\sqrt[n]{a}\right)^k = \sqrt[n]{a^k}$, при $a \geq 0, k = 1,2,3 \ldots, n = 2,3,4 \ldots$ *(теорема 3);*

$\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$, при $a \geq 0, k = 2,3,4 \ldots, n = 2,3,4 \ldots$ *(теорема 4).*

Из теоремы 4 есть важное следствие: $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[k]{\sqrt[n]{a}}$

Следует избегать типичных ошибок, обратим на них внимание:

$\sqrt[n]{a \pm b} \neq \sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b}$, например $\sqrt[3]{8+27} = \sqrt[3]{35} \neq \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{27} = 2 + 3 = 5$.

Пример 5: вычислить: $\sqrt[3]{125 * 8} = \sqrt[3]{125} * \sqrt[3]{8} = 5 * 2 = 10$

Теорема удобна тем, что не нужно выполнять трудоемкое умножение, а иногда, наоборот, раскладывать большие числа на множители.

Пример 6: вычислить: $\sqrt[4]{625 * 16} = \sqrt[4]{625} * \sqrt[4]{16} = 5 * 2 = 10$

Теорема 1 допускает обобщение, например, для произведения трех сомножителей.

Пример 7: вычислить: $\sqrt{100 * 25 * 16} = \sqrt{100} * \sqrt{25} * \sqrt{16} = 10 * 5 * 4 = 200$

Пример 8: вычислить: $\sqrt[3]{1000 * 8 * 27} = \sqrt[3]{1000} * \sqrt[3]{8} * \sqrt[3]{27} = 10 * 2 * 3 = 60$

Пример 9: вычислить: $\sqrt{\frac{25}{16}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{16}} = \frac{5}{4} = 1{,}25$

Пример 10: вычислить: $\sqrt[3]{\frac{64}{27}} = \frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{4}{3}$

Пример 11: вычислить: $(\sqrt{3})^4 = \sqrt{3^4} = \sqrt{81} = 9$

Пример 12: $(\sqrt[3]{2})^6 = \sqrt[3]{2^6} = \sqrt[3]{2^3 * 2^3} = 2 * 2 = 4$

Пример 13: вычислить: $\sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[6]{64} = \sqrt[6]{2^6} = 2$

С другой стороны $\sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[3]{8} = 2$

Пример 14: $\sqrt[5]{\sqrt{1024}} = \sqrt[10]{1024} = \sqrt[3]{2^{10}} = 2$

Пример 15: вычислить: $\sqrt[5]{8} * \sqrt[5]{4} = \sqrt[5]{8 * 4} = \sqrt[5]{32} = 2$


Пример 16: $\sqrt[4]{5\frac{1}{16}} = \sqrt[4]{\frac{5 * 16 + 1}{16}} = \sqrt[4]{\frac{81}{16}} = \frac{\sqrt[4]{81}}{\sqrt[4]{16}} = \frac{3}{2}$

Пример 17: $\sqrt[4]{\sqrt{256}} = \sqrt[8]{256} = \sqrt[8]{2^8} = 2$

Пример 18: решить уравнение $x^4 = 625$;

Решение. $x = \pm\sqrt[4]{625} = \pm 5$ т. к. степень функции четная


Ответ. $x = \pm 5$.



Пример 19: решить уравнение $x^5 = 243$;

Решение. $x = \sqrt[5]{243} = 3$ т. к. степень функции нечетная;

Ответ. $x = 3$.



Вопросы для закрепления:

1. С каким математическим понятием мы работали сегодня – корень n–ой степени
2. Что мы применяли для вычислений корня n–ой степени – свойства
3. Сколько корней имеет уравнение $x^n=a$, если n – нечетное число – один корень
4. Сколько корней имеет уравнение $x^n=a$, если n –четное число – зависит от a:

   если a – отрицательное, то

   если a = 0, то

   если a – положительное, то

Для самостоятельного решения:

1. Вычислить: $\sqrt[4]{0{,}0625}$; $\sqrt[3]{27}$; $\sqrt[3]{0{,}008}$; $\sqrt{\frac{1}{25}}$
2. Вычислить: $(\sqrt{3})^6$; $(\sqrt{3})^7$; $\sqrt{2^4}$; $\sqrt[3]{8^2}$; $(\sqrt[4]{2})^8$
3. Вычислить: $\sqrt[2]{\sqrt[3]{729}}$; $\sqrt[5]{\sqrt[2]{1024}}$; $\sqrt[5]{\sqrt{\sqrt[7]{a^5}}}$; $\sqrt{\sqrt[6]{b^4}}$

Домашнее задание:

1. Законспектировать основные теоретические сведения.
2. Ответить на вопросы для закрепления

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : базовый и углубленный уровни : учебник / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва [и др.]. – 10-е изд., стер. – Москва : Просвещение, 2022. – 463

§6 с. 39-46, №119 (3,4), №125 (3)

Выполненную работу необходимо сфотографировать и отправить на почтовый ящик pushistaV@yandex.ru, Бережная Валерия Александровна (VK)

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИСЫВАЕМ РАБОТУ НА ПОЛЯХ + в сообщении указываем дату/группу/ФИО