

## やや強めC A 6型の 手足口病 とは ？

初期濃厚 確定 併発？

夏バカゼウイルスの1つ： 2011年に大流行した コサキウイルスA 6型です

例年タイプとちがって 手掌/足底に少なく ひじひざに強く  
でて水疱が破れやすい

6才までに 全員が1—2回以上かかります ヘルパン  
ギーナと同じウイルスです

典型的な経過 初日はノドも赤くなく 39度前後 が 2  
4時間以内でたあとに

米粒大よりやや大きめの赤く盛りあがった発疹（若干の  
痛がゆさがあります）が お尻/腰や肘下上・膝下上 にでて  
5日間徐々に増えていきます

胸腹部/背中上部 にもでてくると 水痘（みずぼうそ  
う）との区別が難しくなるので回復期にCA 6 抗体と水痘  
I g G抗体を採血したりします。 水をもって破れて  
カサブタになって茶色くなったあと 7—10日たったの  
ち 消失していきます

ノドチンコ ヨコの 赤いイボ様の水疱が破れると アフ  
タになって痛がったりします

ノドにしみるもの（グレープフルーツなど）は控えて カロ  
リー（肉類・フライ・ハンバーガー・  
ナゲット・プリン・シュークリーム・バナナ・牛乳・アイ  
スクリーム・ヨーグルトなど）をとりましょう

注意事項 単独では セキハナはできません

- ・ 数日してからの高熱/嘔吐/ふらつき/手足のけいれん  
がみられてくると 髄膜炎・脳炎の可能性ができ  
ます 早急に大きな救急病院を受診しましょう
- ・ 1カ月半前後して 指の爪が白くなって 短冊状に脱落  
してきます  
特別な治療はありません 爪がひっかからない様に  
切ったり研いだりしてください

**登園** 発熱が48時間以上なくて飲食が充分にあるのを  
確認してから

登園しましょう。唾液や便や水疱で14日間以上感染  
していきます

厳密な感染予防ができないウイルスなので 脳炎例が多  
発しない限り

許可書は原則不要 になっていますが 食欲の低下する  
期間（4日間前後）は 休園して 体力の維持に努めま  
しょう

入浴 皮疹が水をもって破れることが多いので カサブタ  
ができてうす茶色になるまで 1週間 シャワーにしま  
しょう 石鹸で洗って可です

予防接種 発疹の出始めから2週間ほどたってから予防  
接種しましょう

## やや強めC A 6型の 手足口病 とは ？

初期濃厚 確定 併発？

夏バカゼウイルスの1つ： 2011年に大流行した コサキ  
ウイルスA 6型です

例年タイプとちがって 手掌/足底に少なく ひじひざに強く  
でて水疱が破れやすい

6才までに 全員が1—2回以上かかります ヘルパン  
ギーナと同じウイルスです

典型的な経過 初日はノドも赤くなく 39度前後 が 2  
4時間以内でたあとに

米粒大よりやや大きめの赤く盛りあがった発疹（若干の  
痛がゆさがあります）が お尻/腰や肘下上・膝下上 にでて  
5日間徐々に増えていきます

胸腹部/背中上部 にもでてくると 水痘（みずぼうそ  
う）との区別が難しくなるので回復期にCA 6 抗体と水痘  
I g G抗体を採血したりします。 水をもって破れて  
カサブタになって茶色くなったあと 7—10日たったの  
ち 消失していきます

ノドチンコ ヨコの 赤いイボ様の水疱が破れると アフ  
タになって痛がったりします

ノドにしみるもの（グレープフルーツなど）は控えて カロ  
リー（肉類・フライ・ハンバーガー・  
ナゲット・プリン・シュークリーム・バナナ・牛乳・アイ  
スクリーム・ヨーグルトなど）をとりましょう

注意事項 単独では セキハナはできません

- ・ 数日してからの高熱/嘔吐/ふらつき/手足のけいれん  
がみられてくると 髄膜炎・脳炎の可能性ができ  
ます 早急に大きな救急病院を受診しましょう
- ・ 1カ月半前後して 指の爪が白くなって 短冊状に脱落  
してきます  
特別な治療はありません 爪がひっかからない様に  
切ったり研いだりしてください

**登園** 発熱が48時間以上なくて飲食が充分にあるのを  
確認してから

登園しましょう。唾液や便や水疱で14日間以上感染  
していきます

厳密な感染予防ができないウイルスなので 脳炎例が多  
発しない限り

許可書は原則不要 になっていますが 食欲の低下する  
期間（4日間前後）は 休園して 体力の維持に努めま  
しょう

入浴 皮疹が水をもって破れることが多いので カサブタ  
ができてうす茶色になるまで 1週間 シャワーにしま  
しょう 石鹸で洗って可です

予防接種 発疹の出始めから2週間ほどたってから予防  
接種しましょう

## やや強めC A 6型の 手足口病 とは ？

初期濃厚 確定 併発？

夏バカゼウイルスの1つ： 2011年に大流行した コサキ  
ウイルスA 6型です

例年タイプとちがって 手掌/足底に少なく ひじひざに強く  
でて水疱が破れやすい

6才までに 全員が1—2回以上かかります ヘルパン  
ギーナと同じウイルスです

典型的な経過 初日はノドも赤くなく 39度前後 が 2  
4時間以内でたあとに

米粒大よりやや大きめの赤く盛りあがった発疹（若干の  
痛がゆさがあります）が お尻/腰や肘下上・膝下上 にでて

## 5日間徐々に増えていきます

**胸腹部/背中上部** にもでてくると 水痘（みずぼうそう）との区別が難しくなるので回復期にCA 6抗体と水痘Ig G抗体を採血したりします。 **水をもって破れて** カサブタになって茶色くなったあと **7ー10日たったのち 消失**していきま

**ノドチンコ ヨコの 赤いイボ様の水疱**が破れると **アフタになって痛がったり**します

ノドにしみるもの（グレープフルーツなど）は控えて **カロリー（肉類・フライ・ハンバーガー・ナゲット・プリン・シュークリーム・バナナ・牛乳・アイクリーム・ヨーグルトなど）**をとりましょう

注意事項 単独では セキハナはできません

- ・ **数日してからの高熱/嘔吐/ふらつき/手足のけいれん**がみられてくると **髄膜炎・脳炎の可能性**がでえます 早急に大きな救急病院を受診しましょう
- ・ 1カ月半前後して 指の爪が白くなって 短冊状に脱落してきます 特別な治療はありません 爪がひっかからない様に 切ったり研いだりしてください

**登園** 発熱が48時間以上なくて飲食が充分にあるのを確認してから 登園しましょう。唾液や便や水疱で14日間以上感染していきま 厳密な感染予防ができないウイルスなので 脳炎例が多発しない限り **許可書は原則不要**になっていますが **食欲の低下する期間（4日間前後）は 休園して 体力の維持に努めま****しょう**

入浴 皮疹が水をもって破れることが多いので カサブタができてうす茶色になるまで **1週間 シャワー**にしましょう **石鹸で洗って可**です

予防接種 発疹の出始めから2週間ほどたってから予防接種しましょう

**ノドチンコ ヨコの 赤いイボ様の水疱**が破れると **アフタになって痛がったり**します

ノドにしみるもの（グレープフルーツなど）は控えて **カロリー（肉類・フライ・ハンバーガー・ナゲット・プリン・シュークリーム・バナナ・牛乳・アイクリーム・ヨーグルトなど）**をとりましょう

注意事項 単独では セキハナはできません

- ・ **数日してからの高熱/嘔吐/ふらつき/手足のけいれん**がみられてくると **髄膜炎・脳炎の可能性**がでえます 早急に大きな救急病院を受診しましょう
- ・ 1カ月半前後して 指の爪が白くなって 短冊状に脱落してきます 特別な治療はありません 爪がひっかからない様に 切ったり研いだりしてください

**登園** 発熱が48時間以上なくて飲食が充分にあるのを確認してから 登園しましょう。唾液や便や水疱で14日間以上感染していきま 厳密な感染予防ができないウイルスなので 脳炎例が多発しない限り **許可書は原則不要**になっていますが **食欲の低下する期間（4日間前後）は 休園して 体力の維持に努めま****しょう**

入浴 皮疹が水をもって破れることが多いので カサブタができてうす茶色になるまで **1週間 シャワー**にしましょう **石鹸で洗って可**です

予防接種 発疹の出始めから2週間ほどたってから予防接種しましょう

## **やや強めCA 6型の 手足口病 とは ？**

初期濃厚 確定 併発？

**夏バカゼウイルスの1つ**： 2011年に大流行した **コサキウイルスA 6型**です

例年タイプとちがって 手掌/足底に少なく ひじひざに**強く**でて**水疱が破れやすい**

6才までに 全員が1ー2回以上かかります ヘルパンギーナと同じウイルスです

典型的な経過 初日はノドも赤くなく **39度前後 が 24時間以内**でたあとに

**米粒大よりやや大きめの赤く盛りあがった発疹**（若干の痛がゆさがあります）が **お尻/腰や肘下上・膝下上** にでて **5日間徐々に増えていきます**

**胸腹部/背中上部** にもでてくると 水痘（みずぼうそう）との区別が難しくなるので回復期にCA 6抗体と水痘Ig G抗体を採血したりします。 **水をもって破れて** カサブタになって茶色くなったあと **7ー10日たったのち 消失**していきま