

На виконання наказу Держпродспоживслужби від 17 червня 2016 року № 159 «Про забезпечення виконання основних напрямків державної інформаційної політики у сфері захисту рослин, надання інформації щодо діяльності управлінь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в областях» Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом на 08 вересня 2022 року.

Хрестоцвітими білками в середній чисельності – 2, максимально – 10 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 7 % рослин озимого ріпаку в слабкому ступені на 682 га з 852 га обстежених.

Гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин озимого ріпаку в сильному ступені на 312 га з 852 га обстежених.

Несправжніми гусеницями ріпакового пильщика в середній чисельності 1 екз. на кв.м пошкоджено 6 % рослин озимого ріпаку в слабкому ступені на 337 га з 852 га обстежених.

В посівах кукурудзи гусеницями стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 5 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 14 % обстежених площ (1589 га). Гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,9 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 8 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 28 % від обстеженої площі 1589 га. Польовими клопами в середній чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 13 % від обстеженої площі 1589 га.

Пухирчастою сажкою уражено 2 % рослин (на стеблі 17 %, на качанах 83 %) на 910 га кукурудзи.

Летючою сажкою уражено 2 % рослин (на стеблі 14 %, на качанах 8 %, на волоті 78 %) кукурудзи на 352 га з 1589 га обстежених.

В Петрівському (Олександрійський) районі фузаріозом в середньому уражено 10 % качанів кукурудзи на 217 га з обстежених.

В Долинському (Кропивницький) районі іржею в середньому уражено – 6, максимально – 8 % рослин кукурудзи з середнім розвитком хвороби – 4, максимально – 6 % на 210 га обстежених; гельмінтоспоріозом в середньому уражено 10 % рослин кукурудзи (210 га) з середнім розвитком хвороби 5 %.

Павутинним кліщем в середній чисельності 5 екз. на листок пошкоджено 8 % рослин сої в слабкому ступені на 55 га обстежених площ.

Аскохітозом в середньому уражено – 7, максимально – 15 % рослин сої з середнім розвитком хвороби – 4, максимально – 13 % на 190 га з 255 га обстежених.

В Олександрійському (Олександрійський) районі антракнозом в середньому уражено – 7 % рослин сої з середнім розвитком хвороби 6 % на 15 га обстежених.

Гусеницями бавовникової совки в середній чисельності – 2, максимально – 7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 8, максимально – 10 % рослин соняшнику на 46 % обстежених площ (2236 га).

В Устинівському (Кропивницький) районі гусеницями лучного метелика в

середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин соняшнику на 54 га з 205 га обстежених.

В Олександрійському (Олександрійський) районі гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин соняшнику на 86 га обстежених площ.

Гусеницями соняшникової вогнівки в середній чисельності 1 екз. на кошик заселено і пошкоджено 5 % рослин соняшнику (60 га).

Геліхризовою попелицею в середній чисельності – 6, максимально – 8 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 4, максимально – 7 % рослин соняшнику в слабкому ступені на 340 га з 2236 га обстежених. Подекуди чисельність та шкідливість попелиць контролюється діяльністю ентомофагів.

Польовим клопом в середній чисельності 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин соняшнику в слабкому ступені на 300 га з 2236 га обстежених.

В Устинівському (Кропивницький) районі пероноспорозом в середньому уражено 5 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби 3 % на 90 га з 205 га обстежених.

Фомозом в середньому уражено – 16, максимально – 40 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 11 % на 656 га з 2236 га обстежених.

Сірою гниллю уражено 5 % рослин соняшнику (357 га) в прикореневій – 20, стеблова – 15 %, кошиковій формі – 65 % з розвитком хвороби на кошиках 2 %.

Білою гниллю уражено 3 % рослин соняшнику (352 га) в прикореневій – 51 %, стебловій – 14 %, кошиковій формі – 35 % з розвитком хвороби на кошиках 2 %.

Іржею в середньому уражено – 7, максимально – 10 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 4, максимально – 5 % на 483 га з 2236 га обстежених.

В Олександрійському (Олександрійський) районі борошнистою росою в середньому уражено – 6 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби 5 % на 86 га обстежених; фомопсисом в середньому уражено 7 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби 6 % на 86 га обстежених.

Фітофторозом в середньому уражено 19 % рослин томатів (присадибні ділянки) з середнім розвитком хвороби 12 %. Верхівковою гниллю в середньому уражено 2 % рослин томатів (присадибні ділянки) та 3 % плодів з середнім розвитком хвороби 2 %. Макроспоріозом в середньому уражено 7 % рослин томатів (присадибні ділянки) з середнім розвитком хвороби 3 %.

В Бобринецькому (Кропивницький) районі капустиною попелицею в середній чисельності – 14, максимально – 22 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено 65 % рослин пізньої капусти в слабкому ступені 97 %, середньому – 3 % (присадибні ділянки); хрестоцвітими блішками в середній чисельності 3,5 екз. на рослину заселено і пошкоджено 55 % рослин середньої капусти (присадибні ділянки) в слабкому ступені – 98 %, середньому -2 %; гусеницями капустяної совки в середній чисельності – 1,1, максимально – 2 екз. на

рослину заселено і пошкоджено 8 % рослин пізньої капусти (присадибні ділянки), в т.ч. в слабкому ступені – 96, середньому – 4 %.

Пізні сорти капусти за потреби захищають дозволеними до використання інсектицидами, суворо дотримуючись санітарних вимог щодо збирання врожаю.

Паршею яблуні в середньому уражено – 11, максимально – 13 % листків з середнім розвитком хвороби – 8, максимально – 10 %; в середньому 7 % плодів з середнім розвитком хвороби 4 % на 30 % дерев (4 га саду). Плодовою гниллю в середньому уражено – 23, максимально – 25 % плодів падалиці в середньому під 50 % дерев (4 га саду).

В Петрівському (Олександрійський) районі на площах з-під зернових колосових (170 га) середня чисельність колоній мишоподібних гризунів шкідника 1 на га, в середньому 3 нори на колонію; на площах багаторічних трав (20 га) середня чисельність колоній мишоподібних гризунів шкідника 2 на га, в середньому 3 нори на колонію.